

*Brachyderea rigida*, H. Cass. (*Crepis rigida*, Willd.) Tige haute d'environ trois pieds, épaisse, anguleuse, paniculée supérieurement; feuilles sessiles, semi-amplexicaules, grandes, ovales, fermes, épaisses, scabres, très-échancrées à la base, bordées de grandes dents aiguës, inégales, séparées par des sinus arrondis; les feuilles inférieures plus grandes, oblongues, plus découpées sur les bords; panicule terminale, très-rameuse, nue, munie de petites feuilles squamiformes à la base des ramifications; rameaux pédonculiformes courts, épais, roides, divergens; fleurs jaunes.

Cette plante, que nous avons observée au Jardin du Roi, nous paroît pouvoir constituer un genre principalement caractérisé par le col court, épais, mais bien manifeste, de ses fruits. Ainsi, ce genre diffère du *Crepis*, qui n'a point de col distinct sur ses fruits, et du *Barkhausia*, qui a un long col grêle, comme le *Mulgedium* diffère du *Sonchus* et du *Lactuca*. Le nom de *Brachyderea* signifie *col court*.

31. *DELODERIUM*, H. Cass. Calathide incouronnée, radiiforme, multiflore, fissiflore, androgyniflore. Péricline très-inférieur aux fleurs extérieures, campanulé, ambigu, double, presque imbriqué: l'intérieur formé de squames égales, unisériées, appliquées, se recouvrant par les bords, planes, oblongues-lancéolées, foliacées, membraneuses sur les bords latéraux, armées sur le dos de soies nombreuses, longues, fortes, charnues, subulées; le péricline extérieur à peine distinct de l'intérieur, irrégulier, formé de squames très-inégales, plus courtes, plus étroites, appliquées, oblongues-lancéolées, foliacées, presque nues. Clinanthe large, plan, garni d'appendices ambigus, c'est-à-dire de fimbriilles squamelliformes irrégulières, inégales, dissemblables, très-longues, très-largement laminées, membraneuses, diaphanes, linéaires-subulées, souvent bifides. Ovaires (extérieurs et intérieurs) tous uniformes, oblongs, glabres, amincis supérieurement en un col très-manifeste et très-distinct, qui porte une longue aigrette blanche, composée de squamellules inégales, filiformes, très-fines, hérissées de très-petites barbelules. Corolles un peu pubescentes sur leur partie moyenne, à poils très-fins.

*Deloderium taraxacifolium*, H. Cass. Feuilles radicales, ana-

logues à celles du pissenlit, longues de cinq à six pouces, larges d'environ quinze lignes, membraneuses, glabres sur les deux faces, presque lyrées, à partie inférieure étrécie en forme de pétiole, à partie moyenne divisée sur les deux côtés par de profonds sinus en lobes inégaux, irréguliers, un peu runcinés, à partie supérieure plus large, presque arrondie, un peu dentée ou anguleuse; plusieurs tiges scapiformes, presque nues, cylindriques, striées, glabriuscules, divisées en quelques rameaux longs, grêles, pédonculiformes, nés chacun dans l'aisselle d'une petite feuille bractéiforme, longue, étroite, linéaire-subulée, munie à sa base de deux grandes oreillettes profondément divisées en deux lanières subulées; chaque pédoncule portant, à quelque distance de son sommet, une ou deux petites bractées squamiformes, linéaires-subulées, et terminé par une calathide large d'environ un pouce, composée de fleurs probablement purpurines.

Nous avons fait cette description sur une plante sèche, recueillie aux environs de la Canée, dans l'île de Candie, et qui se trouve dans l'herbier de M. Gay, où elle est étiquetée *Apargia hyoseroides*, Sieber. Quoique très-analogue à l'*Intybellia* et au *Pterotheca*, elle nous semble différer génériquement du premier en ce que ses fruits ont un col très-manifeste et très-distinct, et du second en ce que ses fruits sont tous uniformes, aigrettés et collifères. Elle est en outre remarquable par son péricline ambigu, c'est-à-dire presque autant imbriqué que double, et par les appendices de son clinanthe, qui sont aussi très-ambigus, parce qu'ils ressemblent aux squamelles des *Hypochæris*, quoiqu'ils ne soient point de véritables squamelles. Le nom de *Deloderium* signifie *col manifeste*.

35. OMALOCLINE, H. Cass. Calathide incouronnée, radiatiforme, multiflore, fissiflore, androgyniflore. Péricline inférieur aux fleurs extérieures, ambigu, souvent presque imbriqué en apparence, mais vraiment double : l'intérieur formé de squames égales, subbisériées, parfaitement planes, se recouvrant par les bords, souvent un peu entrecroisées à la base, ovales-lancéolées, foliacées, nullement épaissies, ni charnues, ni coriaces; le péricline extérieur notablement