

molliter villoso-lanuginosis. I in Mauritaniâ circâ Tanger legit cl. Salzmann et circâ Malagam cl. Boissier. Rothia laxiflora Salzm. pl. exs. 1825. Radix exilis. Capit. majora quam A. integrifoliae. (v. s.)

+ *Species exclusæ.*

- A. CHONDRILLOIDES Scop. = *Crepis chondrilloides*.
- A. LANATA Linn. = *Hieracium tomentosum*.
- A. LANATA Habl. = *Leontodon biscutellæfolium*.
- A. NEMAUSENSIS Vill. = *Pterothecea Nemausensis*.
- A. NUDICAULIS Lam. = *Pterothecea Nemausensis*.
- A. PONTANA Vill. = *Hieracium montanum*.

DCCCXLIII. DUBYÆA.

Capitulum multiflorum. Invol. campanulatum imbricatum. Recept. epaleaceum. Achænia plano-compressa striata in collum crassum breve producta. Pappus pluriserialis pilosus albus. — Herbæ habitu Sonchi aut Hieracii aut ferè Mulgedii, erectæ subramosæ. Folia indi-visa dentata. Capitula pauca subcorymbosa. Invol. extus hispida aut aculeolata. Cor. flavæ. — Dux in honorem cl. J. E. Duby qui de Botanicâ Gallicâ et de Algarum historiâ benè meruit et monographiam Primula-cearum Prodromo nostro destinatam diligenter parat.

Sect. I. HIERACIDIUM. — *Hieracii* sp. *Wall.*

Invol. squamæ adpressæ. Achænia margine non tuberculata.

1. D. CRISTULATA, glabra, foliis sessilibus oblongis acutè sinuato-dentatis, summis subamplexicaulibus, invol. squamis exter. ad carinam aculeato-crysta-tis, cæteris glaberrimis. — in Novæ-Hollandiæ orâ meridionali legerunt Botani-ci navig. Baudinianæ. Habitus Sonchi, sed achenium rostratum. Pappus albus multiserialis minus mollis quam Sonchi. Ligulæ exteriore subtus purpu-rascentes. Folia 3 poll. longa, 6-8 lin. lata. (v. s. comm. à Mus. reg. par.)
2. D. HISPIDA, caule ramisque pilis fuscis hispidissimis, foliis hispidulis denta-tis amplexicanibus, inferioribus ovato-cordatis in petiolum latè marginatum decurreptibus, sammis sessilibus, invol. hispidissimo. ♀ in montibus Indiæ orient. Himalaya et Kamaon legit cl. Wallich. *Hieracium hispidum* Don prod. fl. nep. 165. non Forsk. *Hier. heteranthum* Wall. cat. comp. n. 363. (v. s. comm. ab hon. cur. merc. angl. Ind. or.)

Sect. II. SONCHIDIUM. — *Lasiopus D. Don in brit. fl. gard. ser. 2. t. 346 (1836) non Cass. (1817).*

Invol. squamæ squarroæ. Achænia margine tuberculato-scabra.

3. D. SONCHOIDEA, acaulis, foliis radicalibus patulis oblongis subruncinatis, spinuloso-dentatis glabris, scapis hirsutis 1-2-cephalis, invol. squamis apice recurvis acutis. ♀ in Armeniâ. *Lasiopus sonchooides* Don l. c. Invol. ferè Son-chi squarrosi.

DCCCXLIV. MULGEDIUM *Cass. dict. 33 (1824). p. 296. 48. p. 426. Less. syn. 142.* — *Cicerbitæ* pleræque *Wallr. sched. crit. (1822). p. 433.* — *Agathyrsus D. Don in Edinb. phil. journ. 1828-29. p. 305 ex linnæâ 1830. p. 138.* — *Son-chi* sp. flor. cœruleis *Auct.* — *Lactucæ* sp. *Meyer.*

Capit. multiflorum. Invol. calyculato-imbricatum, squamis nempè exterioribus multò brevioribus subimbricatis. Recept. nudum soveola-