

molliter villosa-lanuginosa. ① in Mauritaniâ circa Tanger legit cl. Salzmänn et circa Malagam cl. Boissier. *Rothia laxiflora* Salzm. pl. exs. 1825. Radix exilis. Capit. majora quàm *A. integrifoliæ*. (v. s.)

† *Species exclusæ.*

- A. CHONDRILLOIDES Scop. = *Crepis chondrilloides*.
 A. LANATA Linn. = *Hieracium tomentosum*.
 A. LANATA Habl. = *Leontodon biscutellæfolium*.
 A. NEMAUSENSIS Vill. = *Pterotheca Nemausensis*.
 A. NUDICAULIS Lam. = *Pterotheca Nemausensis*.
 A. PONTANA Vill. = *Hieracium montanum*.

DCCCXLIII. DUBYÆA.

Capitulum multiflorum. Invol. campanulatum imbricatum. Recept. epaleaceum. Achænia plano-compressa striata in collum crassum breve producta. Pappus pluriserialis pilosus albus. — Herbæ habitu *Sonchi* aut *Hieracii* aut ferè *Mulgedii*, erectæ subramosæ. Folia indivisa dentata. Capitula pauca subcorymbosa. Invol. extûs hispida aut aculeolata. Cor. flavæ. — Dixi in honorem cl. J. E. Duby qui de Botanicâ Gallicâ et de Algarum historiâ benè meruit et monographiam *Primulacearum* Prodrómo nostro destinatam diligenter parat.

Sect. I. HIERACIDIUM. — *Hieracii* sp. *Wall.*

Invol. squamæ adpressæ. Achænia margine non tuberculata.

1. D. CRISTULATA, glabra, foliis sessilibus oblongis acutè sinuato-dentatis, summis subamplexicaulibus, invol. squamis exter. ad carinam aculeato-cristatis, cæteris glaberrimis. — in Novæ-Hollandiæ orâ meridionali legerunt Botanici navig. Baudinianæ. Habitus *Sonchi*, sed achæniûm rostratum. Pappus albus multiserialis minùs mollis quàm *Sonchi*. Ligulæ exteriores subtùs purpurascens. Folia 3 poll. longa, 6-8 lin. lata. (v. s. comm. à mus. reg. par.)
2. D. HISPIDA, caule ramisque pilis fuscis hispidissimis, foliis hispidulis dentatis amplexicaulibus, inferioribus ovato-cordatis in petiolum latè marginatum decurrentibus, summis sessilibus, invol. hispidissimo. ♀ in montibus Indiæ orient. Himalaya et Kamaon legit cl. Wallich. *Hieracium hispidum* Don prod. fl. nep. 165. non Forsk. Hier. heteranthum *Wall. cat. comp. n. 363.* (v. s. comm. ab hon. cur. merc. angl. Ind. or.)

Sect. II. SONCHIDIUM. — *Lasiopus* D. *Don in brit. fl. gard. ser. 2. t. 346* (1836) non *Cass. (1817)*.

Invol. squamæ squarrosæ. Achænia margine tuberculato-scabra.

3. D. SONCHOIDEA, acaulis, foliis radicalibus patulis oblongis subtruncinatis spinuloso-dentatis glabris, scapis hirsutis 1-2-cephalis, invol. squamis apice recurvis acutis. ♀ in Armeniâ. *Lasiopus sonchoides* Don l. c. Invol. ferè *Sonchi* squarrosi.

DCCCXLIV. MULGEDIUM *Cass. dict. 33* (1824). p. 296. 48. p. 426. *Less. syn. 142.* — *Cicerbitæ* pleræque *Wallr. sched. crit. (1822).* p. 433. — *Agathyrus* D. *Don in Edinb. phil. journ. 1828-29.* p. 305 ex *linnæâ* 1830. p. 138. — *Sonchi* ap. flor. cœruleis *Auct.* — *Lactuæ* sp. *Meyer.*

Capit. multiflorum. Invol. calyculato-imbricatum, squamis nempe exterioribus multò brevioribus subimbricatis. Recept. nudum foveola-