

1. C. REPENS. *q* in insulis Curilensibus (Don.), Kamtschatka (Linn.). Prenanthes repens Linn. amoen. acad. 2. p. 360. t. 4. f. 3. Chondrilla repens Lam. dict. 2. p. 79. Caulis humifusus sub nodis radicans. Capit. pro ratione plantæ majuscula.

DCCCXXXI. ZACINTHA Tourn. inst. 476. t. 269. Gærtn. fr. 2. p. 358. t. 157. f. 7. Schreb. gen. n. 1248. Cass. dict. 60. p. 228. Less. syn. 138. — Lapsana sp. Linn. — Hedypnoidis sp. Juss. — Rhagadioli sp. All.

Capit. pluriflorum. Invol. squamis parvis calyculatum, cæterum 8-phylum, squamis post anthesin dorso gibbis crassis concavis achænia extima foventibus apice conniventibus. Recept. nudum. Achænia plano-compressa exalata ferè cuneiformia, in rostrum brevissimum attenuata ex Less., erostria ex Gærtn. Pappus uniserialis, setis scabridis caducissimis. — Herba annua dichotoma ferè glabra regionis Mediterraneæ incola. Folia radicalia runcinata, ramea linearis-subulata integra basi sagittata. Capitula terminalia aut lateralia sessilia. Flores lutei.

1. Z. VERRUCOSA (Gærtn. 1. c.). (1) in agris cultis et sterilibus Galloprovinciæ, Liguriæ, Italiae, omnium ferè insul. Mediterraneanarum, Tanriæ, Barbariæ, etc. Z. verrucosa Desf. fl. atl. 2. p. 233. Lapsana Zacintha Linn. sp. 1141. Zacintha Math. hist. 389. ic. Cain. epit. 287. ic. Rhagadiolus Zacintha All. ped. n. 834. Zacintha pendula Ræusch. (v. v. et s.)

f. integrifolia, nana oligocephala, foliis indivisis vix dentatis. (1) in insula Naxo. Oliv. et Brng.! (v. s.)

DCCCXXXII. HETERACIA Fisch. et Mey. ind. sem. h. petrop. 1835. p. 29. ann. sc. nat. bot. 1836. p. 121.

Capit. multiflorum. Invol. campanulatum squamis 8 ad medium concretis constans, basi squamellosum. Recept. planum nudum. Achænia exteriora obpresso-tetragona suberoso-corticata breviter rostrata epapposa, cætera subtetragona in rostrum longissimum desinentia pappo pluriseriali subserrulato capillaceo coronata. — Herba Orientalis annua glabra ramosa. Radix exilis simplex. Caulis fistulosus. Folia sagittata runcinata. Capitula, alia terminalia, alia inter dichotomias aut lateraliter secùs ramos sessilia solitaria. Cor. flavæ. — Genus valde affine Zacinthæ.

1. H. SZOWITZII (F. et M. I. ll. cc.). (1) in campis salsis aridis propè Nakitschiwan Persiæ Rossiaæ conterminæ. (v. s.)

DCCCXXXIII. ENDOPTERA. — Crepidis et Pieridis sp. auct.

Capitulum multiflorum. Invol. duplex, squamis ext. brevissimis, inter, convolutis torulosis post anthesin conniventibus achænia radii demum involventibus. Recept. favoso-areolatum subfimbrilliferum. Achænia radii erostria aut brevissimè rostrata intus 1-alata, disci longius rostrata intus exalata. Pappus piliformis pluriserialis tenuissimus. — Herbae Europæ et Orientales annuae erectæ ramosæ, sæpius pilis rigidulis sparsis asperæ. Folia caulina semiamplexicaulia, cordata seu sagittata, grossè et irregulariter dentata. Capitula matura subglobosa. Flores lutei. — Nomen ex ενδοπτερον intus et πτερον ala.

Sect. 1. GATYONA. — Gatyona Cass. dict. v. 18. p. 184. v. 25. p. 62. Less. syn. 138.

Achænia radii levia incurvata suberostria, disci transversè striata breviter rostrata.