

Spach inter plantas cl. Balansa sub N° 1015 ex arenosis circā Biskara evulgata. Hæc species si ambo genera conjungas *Sonchus Arabicus* erit.

4º *Microrhynchus fallax* J. et Sp. tab. 276 et *M. Arabicus* eorumdem auctorum tab. 277 unicam speciem a *M. nudicauli* Lessing pappo deciduo nec persistenti distinctam mihi sistere videntur *M. fallacis* nomine designandam.

PTEROTHECA OBOVATA Boiss. et Noë. (Sect. *Trichocrepis*.)

Pt. annua pluricaulis, foliis omnibus radicalibus rosulatis obovatis glabris infernè attenuatis minutè et remotè denticulatis denticulis triangularibus apice calcareis suprâ viridibus subtûs rubris, caulinis folia 3-4plò superantibus supernè glanduloso-puberulis semel bisve dichotomis, pedunculis arcuato-patentibus capitulis 3-4plò longioribus, capitulis hemisphærico-obconicis, involuci biserialis phyllis externis paucis quadruplò brevioribus triangulari-lanceolatis adpressis, internis lanceolatis acuminatis dorso pubescenti-setulosis margine membranaceis fructiferis subincrassatis, acheniis omnibus cylindricis costato-striatis pappo niveo eis subæquali superatis exterioribus ad costas scabris cæteris lævibus, receptaculo longè setoso.

Hab. in subalpinis Armeniae meridionalis circā Ardana cl. Noë. Floret Maio.

Folia sessilia 15 lineas longa 7-8 lata obtusissima. Scapi 2-4 cephalii 4-5 pollicares. Capitula magnitudinis eorum Pt. *Nemausensis* Ab hâc ut et a *Pt. bifida* præter foliorum formam differt defectu acheniorum marginalium alborum corticosorum intùs carinatum vel alatorum. *Pt. Aralensis* Bunge quæ quoque acheniis conformibus gaudet ea omnino lævia habet et capitula dimidiò minora cylindrica glabra.

ENDOPTERA DICHOTOMA Boiss. et Bal. (Sect. *Gatyona*.)

E. annua, caule erecto tenui folioso jam paulò suprâ basim dichotomè ramoso flexuoso præter pilos nonnullos in parte inferiori glabro, foliis teneris glabris radicalibus oblongo-spathulatis obtusis in petiolum longè attenuatis apice excepto acutè runcinato-den-

tatis, caulinis oblongis acutè auriculato-amplexicaulibus, summis ad dichotomias supremas minimis setaceis, pedunculis saepius arcuatis capitulo minuto 3-4plò longioribus, involucri biserialis breviter cano-tomentosi phyllis exterioribus paucis brevissimis linear-setaceis interioribus præter indumentum dorso glandulosopilosis lanceolatis acutis demùm navicularibus extùs obtusè carinatis induratis, receptaculo glabro elevato-punctato, flosculis intensè luteis involucrum breviter superantibus, acheniis brevibus rufis oblongis apice brevissimè attenuato-subrostratis pentagono 10 costatis costis 5 sub lente scabris, 5 intermediis minùs prominentibus, acheniis exterioribus curvatulis, pappo niveo deciduo acheniis sublongiore.

Crepis dichotoma Boiss. et Bal. in pl. exs. Orient 1854 № 254.

Hab. rara in declivibus umbrosis ad vias circâ *Smyrnam* cl. Balaiana. Floret Majo et ineunte Junio.

Planta 6-9 pollicaris, folia radicalia cum petiolo 1 $\frac{1}{2}$ -2 pollicaria supernè 6-7 lineas lata. Pedunculi 1-1 $\frac{1}{2}$ pollicares. Capitula eis *Endopteræ asperæ* paulò minora brevioraque. Achenia tantùm lineam longa ea *Endopteræ Dioscoridis* referentia sed dimidiò minora. *E. Dioscoridi* characteribus arctè affinis quamvis caule foliis capitulisque minutis diversissima. Forsan cum eis *Crepidì* rursùs adsocianda a quâ characteribus carpicis genericè vix differunt.

ENDOPTERA INTERMEDIA Boiss. et Blanche. (Sect. *Nemauchenes*.)

E. radice verticali bienni, a collo sèpè multicaulis, caulis erectis procumbentibusque ferè a basi dichotomè ramosis infernè præsertim tomentellis, foliis radicalibus et inferioribus oblongolanceolatis acutè dentatis vel runcinato-dentatis cæteris integris basi acutè auriculatis linear-lanceolatis, omnibus puberulis, pedunculis capitulo 4-5plò longioribus 1-2 squamulis linearibus obsitis, involucri biserialis brevissimè cano-tomentelli squamis exterioribus 5-6 linear-lanceolatis brevissimis acutis internis lanceolatis membranaceo-marginatis præter indumentum dorso 3-5 aculeis subaduncis obsitis demùm induratis intùs concavis dorso incrassato convexis, receptaculo alveolato alveolarum marginibus fimbriato-setosis, acheniis marginalibus squamis involucri inclusis pappo brevi deciduo superatis basi subcurvatis lèvibus subcom-