

Scutellaria Salvia Lévl. nov. sp.

Folia *Salviæ japonicæ* sed simplicia, omnia radicalia, glabra
scapi 15-25 cm.; racemi 7-15 cm. angusti; flores albidi 5 mm.
longi, glabri, resupinati.

Kouy-Tchéou : Gou-Reou, sept. 1912, 600 m n° 3.694.

Ficus Esquiroiana Lévl. nov. sp.

Pulcherrima species, his insignita notis : rami crassi 1 cm.,
dense fulvo-hirsuti; folia ampla cordata acuminata 16-26 cm.
X 12-17 cm., supra atro-viridia, subtus molliter flavidio tomen-
tosa nervis pulchre fulvo-hirsutis, margine tenuiter et argutis-
sime denticulata. Fructus crassi 25 mm. X 15 mm. ovati, dense
fulvo-hirsuti.

Ficus Esquirolii extra genus probata est; unde haec memo-
randa species inventori dicata.

Kouy-Tchéou : Chang-Tsin, 10 nov. 1912, 900 m. n° 3.636.

Nota. — Les plantes publiées au Repertorium de Fedde n°s
1.448-1.449 dans mes Décades sont des *Faberia* pour ceux qui
admettent ce genre : *Faberia Blinii* Lévl., *F. Hieracium* Lévl.,
ce dernier bien voisin du *F. Ceterach* Beauverd.

Faberia Cavaleriei Lévl. nov. sp.

Habitus *F. sinensis* Oliver a quo differt : glabritie totius
plantæ, caule 3-4 foliis munito ; foliis lyratis non runcinatis,
capitulis dimidio minoribus ; floribus cæruleo-violaceis.

Kouy-Tchéou : Yang-Kia Tchong, route de Pin-Fa à Tou
Yun, 23 juillet 1905 (Jules Cavalerie, 2449.)

Abutilon Esquirolii Lévl. nov. sp.

Plantæ 1 m. 50-2 m. alta robusta ; rami griseo-puberuli ; folia
ovata-lanceolata basi vix cordata breviter petiolata supra grieo-
viridia glabra, subtus cinereo-tomentosa nervose reticulata,
flores rosei, sat magni ; apice ramorum fasciculati : stamina
pauca remota.

Kouy-Tchéou : Gou Réou dans les herbages, rare, 700 m. ;
sept. 1912 (Jos. Esquirol, 3668.)
