

fois et demi aussi longs (44<sup>mm</sup>), très grêles, à crêtes fines espacées, presque contractés en bec qui fait un peu plus de la moitié de la longueur. Aigrette égalant le stipe, à soies intérieures élargies bidentées à la base, à soies extérieures sétiformes assez nombreuses. Feuilles glabres oblancéolées, dentées ou sinuées-pennatifides, atténuées en pétiole pubescent. Scapes grêles, à bractéoles sétacées, 1-2-flores. Racine grêle annuelle. — Fl. mai.

Djelfa (Reboud).

**Kalbfussia mulleri**, Sch. bip. var. *Cirtensis*.

Akènes extérieurs atténués en bec, pourvu, comme le reste, de crêtes saillantes entières ; les intérieurs à crêtes fines espacées, longs de 7<sup>mm</sup>, sublinéaires insensiblement atténués en bec. Soies extérieures de l'aigrette nulle. Feuilles glabres pennatifides, à lobes lancéolés acuminés inégaux. Scapes courts 1-3-flores. — Fl. mai.

Environs de Constantine.

**Fidelia** (ou *Millina*) **Reboudiana**.

Péricline pubescent, à folioles linéaires atténuées, dépassant les aigrettes, pourvues quelquefois d'un long poil sétiforme sur la nervure. Akènes d'un brun roux, presque égaux, les extérieurs un peu gibbeux, hérissés de crêtes transversales aiguës, tous contractés en bec grêle et scabre dans la moitié supérieure ; aigrette sale à soies lancéolées scarieuses à la base, un peu plus courte que le fruit ; réceptacle nu. Feuilles glabres, sinuées pennatifides, à lobes anguleux et sinus arrondis. Tiges ascendantes, nues, scapiformes, 2-3 furquées, à pédoncules un peu claviformes. Racine grêle annuelle. Pour ceux qui n'admettraient pas le genre *Fidelia* ou celui de *Millina*, cette plante devra porter le nom de *Leontodon reboudianum*. — Fl. avril.

Zab oriental (Reboud).