

et locum in dumetis montis Vermač prope Cattaro (Dalmat.), et in sylvaticis Viruša Dol infra Crna Planina, Tara et Peručica Dol infra Kom (M. N.), PANTK., l. c., et in sylvaticis sub m. Durmitor (M. N.), PANČ., l. c.

Ad Phoenixopum vimineum, RCHB., VIS., l. cit., adde iconem, RCHB. f., l. c., tab. MCCCCXVIII, f. I, sub Lactuca, et locos in saxosis ad Boljevići distr. Crmnicæ (M. N.), PANČ., l. c., et in locis aridis ins. Veglia (Dalm.), TOMMAS., l. c.

Ad Trichocrepidem bifidam, VIS., l. c., adde locum in cultis ad Limljane distr. Crmnicæ (M. N.), PANČ., l. c., et icon. RCHB. f., l. c., tab. MCCCCXXX. — Huc probabiliter Pterotheca nemausensis, TOMMAS., l. c., p. 47, et Lagoce-
ris bifida KOCH circa Pod Gliva ad Trebinje (Herceg.), PANTK.

Ad Gatyonam Dioscoridis, RCHB., VIS., fl. dalm. II, p. 116, adde iconem, RCHB. f., XIX, tab. MCCCCXVII. — Addatur

Gatyona Pantocsekii, VIS.

G. glaucescens, foliis petiolatis, inferioribus rosulatis puberulis pinnati-partitis, laciniis decurrentibus oblongis spinuloso-tridentatis, reliquis subsessilibus, laciniis elongatis apice subulato-linearibus, summis sessilibus linearibus, caule submonocephalo pubescente angulato, involucre pedunculoque dense piloso-glanduloso, acheniis

Icon. VIS., fl. dalm. supp. alt., pars II, tab. XII. — *a.* flos parum auctus.

Syn. Gatyona Dioscoridis *Var.*? glandulosa, GRIS. in PANTK., adn., p. 48.

Hab. in graminosis sylvaticis circa Dubovac prope Orahovac in Bjelagora (M. N.).

Fl. flavi unicolores. — Annuæ? — Fl. aestate.

Obs. Affinis G. Dioscoridis, quae differt, foliis spathulatis lyrato-pinnatifidis dentatisve nec pinnato-partitis, laciniis triplo quadruplove brevioribus linearibus, summis hastatis laciniatis amplexicaulibus, nec sessilibus, caule divaricato ramoso nec simplici, involucre ob phylla prominula toruloso, nec plano.

Ad Zacyntham verrucosam, GAERTN., VIS., l. c., p. 116, adde locum in apricis circa Cattaro (Dalm.), et Trebinje (Herceg.), PANTK., l. c., p. 48; in asperis ad Vir (M. N.), PANČ., l. c., p. 56; in agris Veglia, Garize (Dalm.), TOMMAS., l. c., p. 47, et iconem, RCHB. f., l. c. XIX, tab. MCCCCXXIV.

Ad Crepidem vesicariam, L., VIS., l. c., p. 116, sub syn. Barkhausia vesicaria SPRENG., adde locum in graminosis circa Pod Gliva prope Trebinje (Herceg.), PANTK., l. c., pag. 48, et in cultis ad Veglia, Capriccio, Panighe (Dal-

mat.), TOMMAS., l. c., p. 47, et iconem, RCHB. f., l. c., tab. MCCCCXXX, fig. II.

Ad *Crepidem setosam*, HALL., VIS., l. c., p. 447, adde locum in campis ad **Cettinje** (M. N.), PANČ., l. c., p. 56, et (sub *Barkhausia*, MCH.) in graminosis circa **Cattaro** (Dalm.), **Dubovac** in **Bjelagora** (Herc.), **Cettinje** et **Rjeka** (M. N.), PANTK., l. c., p. 48, et a **Travnik** ad pedem **Vlassich**, **Czeniza** supra **Kaločsin**, **Serajevo** etc. (Bosnia), SENDTN., et ad iconem, RCHB. fil., l. cit., tabula MCCCCXXXV, fig. I.

Ad *Crepidem foetidam*, L., VIS., l. c., p. 447, adde locum in cultis ad **Cettinje**, et ad asperis ad **Vir** (M. N.), PANČ., l. c., p. 56; in campis aridis **Veglia** monte **Suss** et **Triskavaz** (Dalm.) TOMMAS., l. c., et (sub *Barkhausia*, MCH.) in pascuis circa **Danilov Grad** (M. N.), PANTK., l. c., p. 48, et **Travnik** ad pedem **Vlassich** (Bosnia), SENDTN.; et iconem, RCHB. f., l. c., tab. MCCCCXXXIV. — Addatur

Crepis leontodontoides, ALL., fl. ped. auct., p. 13; RCHB. f., ic. germ. XIX, p. 42.

C. caule erecto subnudo paucifloro gracili, foliis runcinatis pinnati-partitis, basi in petiolum decurrentibus, apice acuminatis integris, involucri phyllis glabriusculis, acheniis apice in rostrum filiforme abrupte contractis.

Syn. *Barkhausia leontodontoides*, DC., prodr. VII, p. 156. *B. leontodontis*, PANTK., l. c., p. 48.

Icon. RCHB. f., l. c., XIX, tab. MCCCCXXXVI, f. II-VII.

Hab. in graminosis circa **Billeki** (Herceg.), PANTK., l. c. Fl. flavi. Fl. aestate. Perenn.

Ad *Crepidem rubram*, L., VIS., l. c., p. 448, adde iconem, RCHB. f., l. c. XIX, tab. MCCCCLV, fig. I.

Ad *Crepidem bulbosam*, CASSIN., VIS., l. c., adde locum in herbis **Bescanova**, **Cassione**, **Ponte**, **S. Maria di Capo** in ins. **Veglia** (Dalmat.); TOMMAS., l. c., p. 47, et iconem RCHB. f., l. c., tab. MCCCCXXXIII, sub *Aetheoriza*, CASSIN. — Addatur

Crepis incarnata, TAUSCH., bot. zeit. II, 1 erg. 61, p. 79, non HOST, KOCH, syn. fl. germ. II, p. 502; RCHB. f., XIX, p. 46.

C. caule aphylo corymboso, foliis obovatis basi attenuatis, denticulatis, bracteis communibus limbo ac dorso inermibus.

Syn. *Hieracium incarnatum*, WULF. in JACQ., coll. II, p. 127. *Hieracium montanum*, SCOP., carn. II, p. 106. *Geracium incarnatum*; RCHB., fl. exc., p. 259.



CATYONA PANTOCSEKII -- Vis.