

814 SYNGENESIA: POLYGAMIA ÆQUALIS.

*Scolymus theophrasti hispanicus. Clus. hist. 2. p. 153,*  
*Carduus Chrysanthemos. Dod. pempt. 725.*  
*Habitat in Italia, Sicilia, G. Narbonensi. &*

ELEPHANTOPUS.

*scaber.* 1. ELEPHANTOPUS foliis oblongis scabris. *Hort. cliff.*  
 390. *Hort. upf.* 147. *Gron. virg.* 176. *Roy. lugdb.* 131.  
*Elephantopus conyzæ folio. Dill. elth. 126. t. 106. f.*  
 126.

*Bidens frutescens, foliis oblongis utrinque acuminatis*  
*venosis & lanuginosis. Breyer. ic. 32. t. 32.*

*Echinophoræ indicæ affinis, semine & floribus in capi-*  
*tulis lævibus in caulium cymis. Pluk. alm. 132. t.*  
 388. f. 6.

*Anaschovadi. Rheed. mal. 10. p. 13. t. 7.*

*Habitat in Indiis. &*

*tomentosus.* 2. ELEPHANTOPUS foliis ovatis tomentosis. *Gron.*  
*virg. 90. \**  
*Habitat in Virginia.*  
*Affinis sorte nimis præcedenti.*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

GUNDELIA.

*Tournefortii* 1. GUNDELIA.

*Gundelia orientalis, acanthi aculeati folio, capite glabro.*  
*Tournef. cor. 51. Itin.*

*Eryngium syriacum, foliis chamæleontis longis & spi-*  
*nosus. Moris. hist. 3. p. 167.*

*Silybum dioscoridis f. Hacub alcardeg serapionis. Rauv.*  
*itin. 74. t. 74.*

*Hacub f. Silybum quibusdam. Bank. hist. 3. p. 84.*

β. *Gundelia orientalis, acanthi aculeati folio, floribus in-*  
*tense purpureis, capite araneosa lanugine obfite. Tour-*  
*nef. cor. 51.*

*Habitat in Armenia, Syria. &*

ECHINOPS.

*Sphaerocephalus* 1. ECHINOPS calyculis unifloris, caule multifloro, fo-  
*lius spinosis supra nudis.*

*Echinops floribus capitatis, calycibus unifloris. Hort.*  
*cliff. 390. Hyrt. upf. 248. Roy. lugdb. 144. Dalib.*  
*paris. 245.*

Echi-

828. GUNDELIA. *Tournef.* 486. *Hacub Vaill.*  
*A. G.* 1718. f. 16.CAL. *Communis* vix ullus, præter folia cingentia.COR. *Composita* tubulata, uniformis: *corollulis hermaphroditis* æqualibus.*Propria* monopetala, clavata: *limbo* ventricoso, quinquefido, erecto.STAM. *Filamenta* quinque, capillaria, brevissima. *Anthera* cylindracea, tubulata, longa.PIST. *Germen* ovatum, receptaculo immersum, squamulis minimis coronatum, infra corollulam. *Stylus* filiformis, corolla longior. *Stigmata* duo, revoluta.PER. nullum. *Semina* plane receptaculo immersa absconduntur.

SEM. solitaria, subrotunda, acuminata, coronata margine obsoleto.

REC. *Commune* conicum, tectum undique *receptaculis* partialibus, divisis *paleis* tricuspидatis.*Partiale* conico-obtusum, quadrangulare, truncatum, *foveolis* quinque, quarum *unica* in centro, *reliquæ* in ambitu excavatæ pro feminibus.829. ECHINOPS.\* *Echinopus Tournef.* 262.  
*Vaill. A. G.* 1718. f. 4. 5. 15.CAL. *Perianthium* proprium oblongum, imbricatum, angulatum: *foliolis* subulatis, superne laxis, erectis, persistentibus.COR. monopetala, longitudine calycis, infundibuliformis: *limbo* quinquefido, reflexo-patente.STAM. *Filamenta* quinque, capillaria, brevissima. *Anthera* cylindracea, tubulata, quinquedentata.PIST. *Germen* oblongum, infra corollulam. *Stylus* filiformis, longitudine corollæ. *Stigma* duplex, oblongum, depresso-fusculum, revolutum.PER. nullum. *Calyx* immutatus, major.

SEM. unicum, ovato-oblongum, basi angustius: apice obtuso, villoso.

OBS. *Species pleraque, in* Receptaculo communi globofo, *numerosos* *flosculos* *descriptos* *cum* *perianthiis* *suis, undique* *in* *globum* *digestos* *affixosque* *continent, Receptaculo* *eodem* *ad* *basin* *cincto* *Calyce* *communi, ad* *pedunculum* *reflexo, &* *disco* *paleis* *setaceis, flosculos* *distinguentibus, instructo.**E. corymbosus* *flores* *gerit* *sparsos, compositos* *s. flosculos* *plures* *intra* *singulum* *perianthium* *partialem.*