

814 SYNGENESIA: POLYGAMIA ÆQUALIS.

*Scolymus theophrasti hispanicus. Clus. hist. 2. p. 153.*  
*Carduus Chrysanthemus. Dod. pempt. 725.*  
*Habitat in Italia, Sicilia, G. Narbonesi. &*

ELEPHANTOPUS.

*scaber.* 1. ELEPHANTOPUS foliis oblongis scabris. *Hort. cliff.*  
 390. *Hort. ups. 147. Gron. virg. 176. Roy. lugdb. 131.*  
*Elephantopus conyzæ folio. Dill. elib. 126. t. 106. f.*  
 126.

*Bidens frutescens, foliis oblongis utriusque acuminatis*  
*venosis & lanuginosis. Breyn. ic. 32. t. 32.*

*Echinophoræ indicæ affinis, semine & floribus in capi-*  
*tulis lævibus in caulium cymis. Pluk. alm. 132. t.*  
 388. f. 6.

*Anaschovadi. Rheed. mal. 10. p. 13. t. 7.*  
*Habitat in Indiis. &*

*tomentosus.* 2. ELEPHANTOPUS foliis ovatis tomentosiss. *Gron.*  
*virg. 90. \**  
*Habitat in Virginia.*  
*Affinis forte nimis præcedenti.*

\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*

GUNDELIA.

*Tournefortii* 1. GUNDELIA.

*Gundelia orientalis, acanthi aculeati folio, capite glabro.*  
*Tournef. cor. 51. Itin.*

*Eryngium syriacum, foliis chamæleontis longis & spi-*  
*nosiss. Moris. hist. 3. p. 167.*

*Silybum dioscoridis f. Hacub alcardeg serapionis. Rauv.*  
*itin. 74. t. 74.*

*Hacub f. Silybum quibusdam. Bauh. hist. 3. p. 84.*

β. *Gundelia orientalis, acanthi aculeati folio, floribus in-*  
*tense purpureis, capite araneosa lanugine obfito. Tour-*  
*nef. cor. 51.*

*Habitat in Armenia, Syria. &*

ECHINOPS.

*sphaerocephalus.* 1. ECHINOPS calyculis unifloris, caule multifloro, fo-  
*lis spinosis supra nudis.*

*Echinops floribus capitatis, calycibus unifloris. Hort.*  
*cliff. 390. Hort. ups. 248. Roy. lugdb. 144. Dalib.*  
*paris. 245.*

Echi-