

diffère des *Nopálées* ou *Cierges* aux dépens desquels elle a été formée, par la présence d'un périsperme, le nombre déterminé de ses pétales et de ses étamines, et des *Saxifragées*, par son fruit charnu.

GROUPE (*compago*). On se sert du mot groupe pour désigner l'ensemble de plusieurs espèces réunies; et selon leur plus ou moins grande importance, selon les caractères plus ou moins saillans des espèces qui le composent, le *groupe* prend le nom de *genre*, *famille*, *classe*, etc. Voyez CLASSIFICATION. — On donne encore le nom de groupe à la réunion des petites capsules qui composent la fructification des *Fougères*. Voyez SORRE.

GRUMELÉ, GRUMELEUX (*grumosus*). Divisé en petites masses arrondies. — Se dit du pollen, quand il forme une masse granulée, comme dans plusieurs *Orchidées*; de la racine, quand elle est formée par la réunion d'un grand nombre de petites masses charnues, comme dans l'*Ophrys nidus avis*.

GUETTARDÉES, GUETTARDIACÉES (*guettardeæ*). Nom donné par M. de Candolle et par M. Kunth à une section de la famille des *Rubiacées*.

GUEULE (*fleurs en*). Voyez PERSONNÉE et LABIÉE.

GUNDÉLIACÉES (*gundeliaceæ*). Nom d'une tribu établie par M. de Candolle, dans les *Cynarocéphales* de M. de Jussieu. Elle contient le genre *Gundelia* et le genre *Acyrocarpha* qui appartiennent à la famille des *Calycétrées*.

GUTTIERS, GUTTIFÈRES (*guttifera*). Famille de plantes dicotylédones appartenant à l'*Hypopétalie* de M. de Jussieu, et aux *Thalamiflores* de M. de Candolle. Ses caractères sont, d'après M. Choisy : fleurs hermaphrodites, dioïques ou polygames; calice persistant, composé de deux à six sépales arrondis, membraneux, opposés, et se renouvelant, quelquefois inégaux et colorés (rarement nuls); corolle formée de quatre à dix pétales, le plus souvent jaunes; étamines hypogynes nombreuses, rarement définies, dont les filets de diverses longueurs portent des anthères allongées, adnées, déhiscentes longitudinalement, rarement extrorses, quelquefois très-petites et simulant deux pores; ovaire unique, libre, surmonté d'un style court qui manque quelquefois, et d'un stigmate, tantôt sessile, pelté et radié, tantôt à plusieurs lobes situés au sommet du style, ou plus rarement déprimé et concave. Le fruit est capsulaire, bacciforme ou drupacé, muni d'un péricarpe épais et à plusieurs valves, dont les bords le plus ordinairement sont rentrés et fixés à un placenta unique ou à plusieurs placentas épais; graines peu nombreuses dans les fruits uniloculaires, solitaires ou en petit nombre dans chaque loge des drupes ou baies mul-