

concreta, costis 2 intercalibus 2 dorsilibus. Flores nulli stellatae.—*Afr. aust.*, *ic. Australia et Tasmania capillaris*.

810. *Acetosella*. *Achaea repens* villosa, paleis hyalinae sepe excurrentia concreta, costis 2-3 dorsilibus in alae rigidae sepe inflexae integrus v. dentata producta. Flores nulli fertiles.—*Afr. aust.*

811. *Vernonia*. *Achaea glabra*, calyx v. paleolis minime concreta, costis 2-3 dorsilibus in alae rigidae sepe inflexae producta. Flores nulli fertiles.—*Afr. aust.*

Baltrilia L. *Gorteriog.* Capitula disciformia. *Laudaciæ laevior* lati macrocarpa, epicae anelli longissimis v. vario foliaceo-dentata.

* *Folia serrata*. *Eriopteridi abrotani brava*.

812. *Gorteria*. Capitula radiata. Involucrum ovoidem, densum globosum, bracteis acutisimis v. spinosissimis. *Achaea calva* v. paleis brevibus concreta, pericarpio late membranoso, apice pilosa v. lassa. Herba diffusa, ramosa, hispida. Folia integra v. dentata. Capitula sessilia v. breviter pedunculata.—*Afr. aust.*

813. *Gazania*. Capitula radiata. Involucrum sessilestans v. rufa lata, bracteis non spinosissimis. *Achaea longe dentata* villosa. Pappi paleis floriferis, hyalini. Herba subaristata v. diffusa, non-foliosa v. globosa. Folia integra v. pinnatisecta. Capitula pedunculata.—*Afr. aust.*

814. *Harreria*. Capitula radiata. Involucrum et schizoma *Gazania*. Pappus n. v. non-serratus dentatus in actis diffusa. Fructiculi ramosissimi; persistunt. Capitula parva.—*Afr. aust.*

* *Folia septentrionalis spinoso-dentata v. rigida*. *Eriopteridi abrotani lepidotodes*.

815. *Centaura*. Capitula radiata. Involucrum spinosum. *Achaea glabra*, calyx, apice trinervia v. appendice globosa rufa lata terminalis. Fructus suffrutescens, foliis spinoso-dentatis levigatis, capitulis parva sessilibus.—*Afr. aust.* et *fug.*

816. *Baccharis*. Capitula radiata v. homogena. Involucrum spinosum. *Achaea villosa*. Pappi paleis n. lassa v. elongata, interdum aristata. Herba v. fruticuli foliis spinoso-dentatis. Capitula solitaria v. myrsinosa.—*Afr. aust.* et *fug.*

817. *Brephancosma*. Capitula homogena. Involucrum spinosum. Pappi paleis breves, in capsulae sessiles. Herba varians, foliis spinoso-dentatis. Capitula myrsinosa.—*Afr. aust.*

818. *Diosma*. Capitula radiata v. homogena. Involucrum lassum bracteis exterioribus in appendice foliacea expanso. Pappi paleis breves, sepe lassa, basi concreta. Herba dense, subinclusa. Capitula brevior pedunculata.—*Afr. aust.*

Baltrilia L. *Quadrifolia*. Capitula homogenea, at *fura*, in globose densae aggregata, bracteis bracteis spinosissimis. *Eriopteridi palustris*.

819. *Glossyrea*. Glomeruli ovoides-globosi, polycephali, terminalis. Capitulum basiliare suspiculata, bracteis inter se et cum paleis ante connatis apicis in spinis brevis subtilis. Achaeum axillare perfectum, rotundum subtiliter. Pappus capitellaria. Herba, foliis pinnatifidis spinosissimisque *Cordia* v. *Nodosa*—*Oreina*.

820. *Platycodon*. Glomeruli magi, depresso-globosi, ad cellum plantae subcaerulea sessiles. Capitulum lassum subglobosum, bracteis latis exterioribus spinosissimis. Eriopteridi paleis lassi subtilis, lassa. Achaea axillare perfecta. Pappi paleis 4-10, rugosae. Folia radicans pinnatisecta, solitus alta.—*Afr. aust.*

Tribus XL. Cynareae. Capitula heterogena squamiformia, v. radios heterogenea foliis in amictis 1-axillatis neutris v. variisimis v. Iaevularia laeviora axillatio inibent, sepe varicosae v. horizonte apicibus numerosae spinosissimae v. axillae-appendiculatae. Eriopteridi septentrionalis densae solitariae v. paleis plus rufis fuscis dividere possunt. *Cordia* caerulea 3-nervia, forma 2 laevius angustis v. laevioris cylindrica v. basi truncata, rotunda v. oblique, ad medium v. profundius 3-fida, laevius angustis; florum multorum conniventes v. ampliatae; foliacearum laticoribus parvus, filiformis, v. si in radice expansus, laminae *Cichorium* more 3-nervia. Achaeum basi rugosata, circinatae anthonomus contingentes rufous appendiculatis, appendiculæ (axillæ) sepias fasciata, rufa ad successum rotundata v. horizontale latique, ruficrus obcordata. Styli 8. 2 rami septem breves v. horizontali, rugosi, obtusangulari, conniventes v. distans paleis, extrorsum papillato-pubescentes, pale