

DCCLXXXIII. HÆNSELERA Boiss. ined. non Lag.

Capit. multiflorum. Invol. campanulatum pluriseriale imbricatum, squamis margine membranaceis calloso-acuminatis. Recept. inter flores paleas basi carinatas apice acuminatas achæniis longiores gerens. Achænia obpyramidata pentagona. Pappus 1-serialis, paleis 5 scarioso-pergamaceis basi latis, in fl. exter. brevibus subobtusis, in inter. longioribus acuminatis. — Herba perennis glabra acaulis. Radix cylindracea aut parcè ramosa. Folia radicalia, exter. obovata dentata, cætera oblonga pinnatilobata, lobis dentatis. Scapus foliis duplò triplòe longior erectus 1-cephalus. Flores flavi. — Genus stricto sensu ex receptac. paleaceo ad Scolymeas referendum esset sed ex habitu toto propè Catantanchem et Calaim potius referendum. — Hænselera Lag. est Physospermum. Conf. prod. iv. p. 246.

1. **H. GRANATENSIS** (Boiss.) descr. et icon. ined.). \mathcal{U} in montibus regni Granatensis rarissima, nempè in Sierra Nevada loco dicto Cerro da Trevenke in declivibus argilloso-cretareis legit et mecum communic. cl. Edm. Boissier. (v. s.)

DCCLXXXIV. CATANANCHE Vaill. act. ac. par. 1721. p. 215. Linn. gen. n. 920. Gœrtz. fr. 2. p. 356. t. 157. Cass. dict. 7. p. 265. Less. syn. 128. — Catanance Tourn. inst. t. 271.

Capitulum multiflorum. Invol. squamæ scariosæ multiseriales imbricatae. Recept. planum fimbriifero-pilosum. Styli rami breves ferè ovoidei. Achænia turbinata erostria sulcato-pentagona adpressè setosa. Pappus 5-7-paleaceus longus, paleis longissimè acuminatis æqualibus denticulatis. — Herbæ regionis Mediterraneæ incolæ. Folia sæpius omnia radicalia lanceolata ferè graminea. Caules elongati ramosi subnudi ramis apice 1-cephalis, aut simplices 1-cephali. Cor. cœruleæ aut luteæ.

1. **C. CORULEA** (Linn. sp. 1142), foliis villosis linearibus interdùm basi pinna-tidifis, invol. squamis ovatis nervo medio in mucronem producto. \mathcal{U} Linn. (I) Ger. in collibus saxosis Galliae et Hispanie australis, Liguria, Barbaria, Lam. ill. t. 658. f. 1. Schkuhr handb. t. 226. — Barr. ic. t. 1134. Dod. pempt. 638 ic. Corollæ cœruleæ ferè Cichorii. (v. v.)
2. **C. LUTEA** (Linn. sp. 1142), foliis villosis linear-lanceolatis trinerviis dentatis aut integerrimis, invol. squamis exter. ovatis acutis, inter. elongatis acuminatis. (I) in arvis regionis Mediterraneæ, in Barbaria (Desf. Salzm.), Cretâ (Alp.), Oriente (Labill.), Siciliâ (Guss.!), Splitb.!, Pedemontio circa Breglio (All.) Lam. ill. t. 658. f. 2. Schkuhr. handb. t. 226. Reichenh. fl. exc. 1. p. 250 (excl. syn. Cass.). — Barr. ic. t. 1135. Bocc. mus. t. 7. Capitula flava paulò quam prioris minora. (v. s.)
3. **C. CESPITOSA** (Desf. fl. atl. 2. p. 238), foliis cespitosis subcarnosis, aliis subulatis integerrimis, aliis latioribus inæqualiter dentatis, invol. squamis obtusis. \mathcal{U} in Atlante propè Tlemsen locis arenosis. Scapi 1-cephali. Invol. globosum. Flores flavi.

† *Species exclusa.*

C. GRÆCA Linn. — *Hymenonema Græcum.*

DCCLXXXV. CICHORIUM Tourn. inst. t. 272. Linn. gen. n. 921. Gœrtz. fr. 2. p. 357. t. 157. Cass. dict. 8. p. 525. — Cichorium et Acanthophyton Less.

Capitulum multi- aut pluriflorum. Invol. duplex, exterius breve circ. 5-phyllum, interius longum circ. 8-10-phyllum. Recept. planiusculum epaleaceum, interdùm parcè alveolato-fimbriiforum. Achænia obovata