

## DCCLXXXIII. HENSELERA Boiss. ined. non Lag.

Capit. multiflorum. Invol. campanulatum pluriseriale imbricatum, squamis margine membranaceis callosso-acuminatis. Recept. inter flores palens basi carinatas apice acuminatas achenis longiores gerens. Achænia obpyramidalis pentagona. Pappus 1-serialis, paleis 5 scarioso-pigmentatis basi latis, in fl. exter. brevibus subobtusis, in inter. longioribus acuminatis. — Herba perennis glabra scaulis. Radix cylindracea aut parvè ramosa. Folia radicalia, exter. obovata dentata, cetera oblonga planatilobata, lobis dentatis. Scapus foliis duplo triplò longior erectus 1-cephalus. Flores flavi. — Genus stricto sensu ex receptac. paleaceo ad Scolymeas referendum esset sed ex habitu toto propè Catantanchem et Galanthem potius referendum. — Hæselera Lag. est Phytospermum, Conf. prod. iv. p. 246.

2. H. GRAMATENAE (Boiss.) deser. et icon. ined.). 2f. in montibus regni Græcensis rarissima, nempè in Sierra Nevada loco dicto Cerro da Trevenque in declivibus argilloso-cretaceis legit et mecum communic. cl. Edm. Boissier. (v. s.)

## DCCLXXXIV. CATANANCHE Vail. est. ac. par. 1721. p. 325. Linn. gen. n. 920. Gert. fr. 2. p. 356. t. 157. Cass. dict. 7. p. 265. Less. syn. 125. — Catananche Tourn. inst. t. 371.

Capitulum multiflorum. Invol. squame scariosse multiseriales imbricate. Recept. planum fimbriifero-pilosum. Styli rami breves ferè ovoidei. Achænia turbinata erostria sulcato-pentagona adpressè setosa. Pappus 5-7-paleaceus longus, paleis longissimè acuminatis squallibus denticulatis. — Herbe regionis Mediterraneæ incole. Folia sepiùs omnia radicalia lanceolata ferè graminæ. Caules elongati ramosi subnudi ramis apice 1-cephali, aut simplices 1-cephali. Cor. corruæ aut luteæ.

1. C. CORNUARIA (Linn. sp. 1143), foliis villosis linearibus interdum basi pinnatifidis, invol. squamis ovatis verso medio in mucronem producto. 2f. Linn. (I) Ger. in collibus saxonis Gallie et Hispaniae australis, Liguria, Barberia. Lam. ill. t. 653. L. 1. Schkuhr handb. t. 226. — Barr. sc. t. 1134. Dod. pempt. 618 lo. Corolla corollæ ferè Cichorii. (v. v.)

2. C. ZOTZA (Linn. sp. 1149), foliis villosis linear-lanceolatis trinerviis dentatis aut integerrimis, invol. squamis exter. ovatis acutis, inter. elongatis acuminatis. (I) In arvis regionis Mediterraneæ, in Barberia (Desf. Salaz.!), Crete (Alp.), Oriente (Lebæll.), Siciliâ (Guss. Spilth.), Pedemontio circa Bergamo (All.) Lam. ill. t. 658. f. 2. Schkuhr. handb. t. 226. Reichenb. fl. exc. t. p. 250 (excl. syn. Cass.). — Barr. sc. t. 1139. Boce. mus. t. 7. Capitula flava paulò quidem prioris minore. (v. s.)

3. C. cesprosa (Desf. fl. sil. 2. p. 438), foliis cespitosis subcarnosis, aliis subobtusis integerrimis, aliis latiobtus laxqualiter dentatis, invol. squamis obtusis. 2f. in Atlantic propè Tlemcen locis arenosis. Scapus 1-cephali. Invol. globosum. Flores flavi.

## † Species exclusa.

C. Glæsa Linn. = Hymenoxys Græcæ.

## DCCLXXXV. CICHORIUM Tourn. inst. t. 372. Linn. ges. n. 931. Gert. fr. 2. p. 357. t. 157. Cass. dict. 8. p. 525. — Cichorium et Acanthophyton Less.

Capitulum multi- aut pluriflorum. Invol. duplex, exterius breve circ. 5-phyllicum, interius longum circ. 8-10-phyllicum. Recept. planiusculum cespitosum, interdum parvè alveolato-fimbriiforum. Achænia obovata