

gis dentatis, superioribus lanceolatis integerrimis sagittatis, calyce adpresso cauleqve hirsutis. *W.*  
*Suppl.*

*Hab.* — — 24. D. intr. 1814.

### 925. HEDYPNOIS.

6. (4.5). *H. CASPIA*: caulis ramosis diffusis hispidis, foliis oblongis amplexicaulis remote denticulatis, squamis calycis fructiferæ undique hispidis.  
*Hab.* ad Mare caspic. O. D. intr. 1815. ex horto ~~Jin.~~  
dobon. sub hoc nomine.

### 928. ACHYRÖPHORUS.

6. *A. BALBISII*: foliis runcinato-dentatis hispidis obtusis, caule subramoso nudo calyceqve glabro.  
*Hypochaeris Balbisii Willd. Suppl.*  
*Hab.* in Italia? O. D. intr. 1815.

### 929. LAPSANA.

4. (1.2). *L. PUBESCENS mihi*: caulescens ramosa pubescens, foliis radicalibus pinnatis lyratis angulatis, superioribus ovatis basi pinnatifidis sinuato-dentatis, supremis lanceolatis sessilibus integerrimis, calycibus glabris.  
*Hab.* — — O. D. intr. 1815 ex horto Monspess. sub nomine *Laps. grandiflora*.

### 937. SERRATULA.

1. *S. TINCORIA y. integrifolia.*  
*Hab.* in Europa. 24. D. intr. 1816.

### 938. CARDUUS.

24. (12-13). *C. TENUIFLORUS*: foliis decurrentibus sinuatis spinosis subtus tomentosis, calycibus subcylindricis aggregatis sessilibus, squamis lanceolatis erectiusculis. *Smith. brit.*  
*Hab.* in Anglia. O. D. intr. 1817.