

In Dalmatien bei Pola nach Strnb. bei Cittanova in Istrien, nach Bias. — Mai. ☉

1627. *H. rhagodioloides* W. anthodio hispido, fructifero contracto, caule a basi diviso, foliis lineari-oblongis sinuato-pinnatifidis, ped. vix incrassatis longissimis rigidis. *Hyos. Hedypnois* L. *Hyos. cretica* Cav. ic. 43. et *Ten.* Radius subtus livide vittatus. — Auf dem Sande b. Nizza: v. *Charp.* — Mai. ☉

1628. *H. furfuracea* Rchb. anthodio furfuraceo-hirtello, fructifero apicibus reflexo, caule a basi diviso adscendente paucifolio, fol. rad. obovatis acutis sinuato-dentatis, caulinis lanceolatis integerrimis, pedunculis longissimis laxis. Habitus *Hy-*

CCCXXIII. *Hyoseris* L. *Schweinsalat.* Anthod. e squamis aequalibus, quibusdam accessoriis minoribus. Rec. nudum. Achen. radii pappo paleaceo, disci paleis inaequalibus. — Scapi radicales monocephali. —

1630. *H. scabra* L. foliis lyrato-pinnatifidis dentatis scabriusculis, laciniis inflexis, scapis apice inflatis, squamis accessoriis alternantibus. *Hierac. Tragopog. fol.* *Bocc. mus.* t. 106. *Rhagod. scaber* All. *Hedypn. coronopifolia* *Ten.* Humilis, depressa, vix aliquid scabrum. — In Oliven gärten um Nizza, Dalmatien: *Peter.* — Mai. ☉

1631. *H. radiata* L. foliis glabris runcinato-pinnatifidis, laciniis dentato-angulatis reversis, terminali tridentata, scapis aequalibus. *Pluck.*

CCCXXIV. *Arnoseris* Gärtn. *Lämmersalat.* Anthod. e squamis aequalibus, fructiferum connivens torulosum. Rec. nudum. Achen. prismatica pappo patellari angulato.

1633. *A. pusilla* Gärt. t. 157. *Laps. pusilla* Willd. *Hook.* Lond. t. 65. *Hyoseris minima* Linn. *Schk.* t. 224. *Engl. Bot.* 95. *Fl. D.* 201. Folia radicalia obovato-oblonga den-

CCCXXV. *Catananche* T. *Rasselblume.* Anthod. imbricatum scariosum. Rec. paleaceum. Achen. obverse pyramidata pentagona, pappo e paleis quinque acuminatis.

1634. *C. lutea* L. anthodii squamis superioribus elongatis exsertis flosculos excedentibus. *Bocc. mus.* t. 7. *Barr. ic.* 1135. *Schk.* t. 226. analysis. *Hymenonema* H. *Cass.* Folia lanceolata, dentata, trinervia, capit. parvum. Flosc. flavi. — Bei Breglio in Piemont. — Jul. Aug. ☉

CCCXXVI. *Cichorium* T. *Cichorie.* Anthod. duplex, int. aequale erectum, ext. brevius inaequale laxum. Rec. subnudum. Achen.

poch. glabrae. — Bei Nizza: v. *Charp.* — Mai. ☉

1629. *H. crepidiformis* Rchb. anthodio incano-hirtello, caule erecto superne ramoso folioso, foliis oblongis profunde sinuato-serratis integerrimisque, pedunculis elongatis vix incrassatis. Habitus erectum fere *Gatyonae* refert, sed tota hispida, ligulae subtus croceo-vittatae. — Bei Nizza: v. *Charp.* — Mai. ☉

Obs. Larga speciminum spontaneorum cultorumque series tandem generis hujus intricatissimi explicacionem edere licuit. Species in rerum natura optimae sunt, in libris pessimae erant. Iterum iterumque educatae, habitus peculiaris et characterum constantiam luculenter comprobant.

t. 37. f. 2. *Tarax. saxatile* *Bocc. mus.* t. 106. *Barr.* 237. sed in nostra radix multo crassior. *Rhagod. radiatus* All. — An Mauern, Hügeln am Strande bei Nizza, Genua. — Mai. 4

1632. *H. foetida* L. foliis runcinato-pinnatifidis laciniis rhombeis, pappo subnullo. *Waldst. Kit.* t. 49. *Lapsana foetida* W. *Sturm* 37. *Aposeris* — *Neck.* — Zwischen Gebüsch in waldigen Bergen auf Kalkboden in Salzburg, bei München, längs der ganzen Alpenkette bis zum Süden. — Mai. Juni. 4

tata, caulina subnulla, caulis tener spithamaeus divisus pedunculi inflati. — Auf Aeckern unter Saat. — Mai. Juni. ☉

1635. *C. coerulea* L. anthodii squamis aequaliter imbricatis, ligulis exsertis. *Barr. ic.* 1134. *Schk.* t. 226. Major, imprimis flos qui corollis coeruleis fere *Cichorium* refert. — Häufig auf dürren Plätzen im Gebiet von Nizza, Ligurien; auf Thonboden bei Turin. — Juli. Aug. ☉