

Radix perennis, simplex, fibrillosa : Folia radicalia primora elliptica, obsoletè dentata, reliqua linearis-lanceolata, inæqualiter remotèque sinuato-dentata, omnia in petiolum attenuata, margine præsertim scabriuscula; caulina dentato-pinnatifida, summa linearis-lanceolata, integerrima : Pedunculi ex eadem radice plures, filiformes, nudi, foliorum longitudine, uniflori : Caulis pedunculis radicalibus vix longior, uno altero folio munitus, apicem versus florifer; bractæ linearis-acuminatæ, ex extremis pedunculis in caliculum laxum confluentes, dorso nervoso, setuloso, hispido : Flos parvus, 7. mill. longus : Calycis foliola 9 — 10 in cylindrum conniventia, linearis-acuta, margine submembranaceo, nervoso, setuloso : Corolla lutea, calyce duplò ferè longior : Ligulæ quinque-dentatae : Semen lineare : Pappus sessilis, densis, et scabris pilis compositus : Receptaculum nudum.

H. in Cyrenaicâ.

Expl. tab. XXI. fig. 1. a Semiflosculus cum pappo et semine; *b* calycis foliolum.

HEDYPNOIS LACINIFLORA : Foliis caulinis amplexicaulibus, lanceolatis; pedunculis elongatis, supernè incrassatis, nudis; ligulis quadrifidis, lacinulis apice glandulosis. TAB. XVII. fig. 2.

Pars inferior plantæ deest : Caulis ramosus, in pedunculos abiens filiformes, elongatos, nudos, apicem versus crassescentes, hirtos, unifloros : Folia caulinis ad peduncularum basim amplexicaulia, lanceolata, utrinque hirsuta, integerrima : Flos 10 — 11 millim. longus : Calyx cylindricus, totus setulis albis, contortis, brevibus refertus; basi bracteolis nonnullis calyculatus, brevissimis, ovato-acutis, linearibusque, adpressis; foliola decem, unicâ serie disposita, linearis-acuta, dorso nervosa : Corolla flava, calycis longitudinis tertiam partem superans : Semiflosculi tubus hispidus; ligula apice 4 — 5 fida, lacinulis apice glandulâ nigra notatis : Semina linearia, exteriora squamis laceris, brevibus; interiora paleis quinque coronata, linearis-acuminatis : Receptaculum nudum.

H. in littore Magnæ Syrteos.

Expl. TAB. XVII. fig. 2. e Semen disci pappo paleaceo coronatum; *f* semiflosculus exterior, cum semine.

CATANANCHE LUTEA : Linn. Sp. Pl. 1142. Desfont. Fl. atl. II. 259. Smith Fl. gr. Prodr. 145. Guss. Cat. Pl. sicil. Ten. Fl. neap. II. 176. Seb. et Mau. Fl. rom. 277. All. Fl. ped. n. 754.

H. in Cyrenaicæ collibus.

Obs. Fig. Barr. l. c. vel pessima, vel speciem diversam refert. Fide Allionii in lignisticam civem recipio, licet in locis ab eodem memoratis eamdem frustrè perquisiverim, eiusdemque defectus in Galliâ Provinciali dubia confirmant.

CARDUUS TENUIFLORUS : Willd. Sp. Pl. III. 1652. Smith Fl. gr. Prodr. II. 149. Ten. Fl. neap. Viviani Herb. Fl. lig. Decand. Fl. franc. IV. 79.

H. in Cyrenaicæ montibus.

ATRACTYLIS CAESPITOSA : Desfont. Fl. atl. II. 254. Tab. 225. ACARNA CAESPITOSA : Willd. Sp. Pl. III. p. III. 1700.

H. in maritimis Tripolitanis.

STÆHLINA CHAMÆPEUCE : Lin. Syst. Nat. ed 12 : II. 538. Smith. Fl. gr. Prodr. II. p. I. 163. SERRATULA Chamæpeuce Linn. Sp. Pl. 1147.

S. Caule fruticoso tomentoso; foliis sparsis linearibus, integerrimis, margine revolutis,

longissimis, floribus corymbosis, calycibus globosis, foliolis linearis-acuminatis, exterioribus subreflexis subulatis. Nob. TAB. XXIII.

Caulis totus denso tomento niveo tectus, 4 — 8 decim. longus, teres, erectiusculus, infernè simplex, denudatus, hinc ramulos 3 — 5 subverticillatos emittens, apicem versus corymbosus, in pedunculos 4 — 6 saepius unifloros, divisos: Folia sparsa, sessilia, linearia, acuminata, integerrima, 1. decim. cum dimidio longa, 3. millim. lata, ob marginem revolutum ferè filiformia; subtus incana, supernè, per ætatem præsertim, nudiuscula, superiora ad basim peduncularum longè breviora, basim versus paulò latiora, quandoque utrinque lacinulâ unâ alterâve mucronatâ aucta: Pedunculi subnudi, saepius uniflori. Calyx 2. cent. longus; totidemque latus, hemisphæricus, tomentoso-floccosus; imbricatus, foliolis linearis-acuminatis, interioribus apice purpurascenscentibus, erectis, exterioribus, basilaribus præsertim, rigidioribus, subulatis, patentibus: Corolla purpurea; flosculi duo centim. cum dimidio longi; tubus filiformis, basi incurvatus, supernè ampliatus, quinquefidus, laciñiis linearibus, obtusis, suberectis: Stamina quinque; filamenta brevia, ad tubi dilatationem inserta, mediò plumosa, seu potius villoso-cirrhosa; Antheræ in tubum coalitæ, longitudinem laciniarum corollæ æquans, apice quinquedentatum, basi pro singulâ antherâ membranulas tenues bipartitas, seu bifidas emittens: Stylus lætè purpureus, longitudine antherarum; stigma brevissimè bifidum: Germen oblongum, teretiusculum, basi paulò coarctatum: Pappus germinis è calyce exsertus: Semen obovatum glaberrimum: Pappus densissimus, argenteus ex setulis crassiusculis, pilis brevibus, subæqualibus, disticis plumbosus: Receptaculum setulis argenteis densissimis, medium calycis longitudinem æquantibus, stipatum.

H. in rupibus maritimis Pentapoleos.

Obs. Non sufficit hanc speciem cum nonnullis congenerum ex gr. cum *S. dubia* comparasse, ut dissensu in characteribus genericis perspecto, in novum genus sistatur. In primis statuendum videtur, quomodo vetus Stæhlinæ genus reformare conveniat: Nam quot in hoc genere species totidem fortasse aberrationes; quæ si pro unaquaque specie sedulò notentur, ut jam in nonnullis optimo consilio facere adgressus est Clar. Smithius in Fl. gr. Prodr. tunc quid pro vetere *S.* genere retinendum, quid seiungendum perspicue innotescet. Credo Sibthorpii fide clar. Smithium dixisse antheras basi non plumosas, cuius errorem facile erit occulatissimo Botanico recognoscere: Interim observare præstat, in speciebus, quæ antheris basi plumosis dicuntur, num antheræ ipsæ, an potius filamenta, ut in hâc specie, barbâ instruantur, quod minùs accurate observatum fuisse suspicor. Veterum botanicorum huius speciei descriptiones, et figuræ prorsus ineptæ. Iconum quatuor quæ de hâc specie profferuntur, Alpini *De Pl. exot.* 76. Plucknetii *Alm. tab.* 94. f. 3. Moris. *Hist. Pl. III. tab.* 26. fig. 8. et Ponæ Monte Baldo *descr.* p. 75. quam pessimam appellem ambigo. In Italiâ, neque in Italîs insulis, quod sciam, nondum reperta. In Florâ gallicâ quoque desideratur, licet nactâ occasione ex Stæhlinæ genere Clar. Decandolius, *Fl. franc.* IV. 106. ad Cirsii genus amendandam esse declaraverit: Magis Borealem latitudinem fortasse assequitur in oris Illyricis, ubi solertissimus Anguillara eamdem reperisse refert in Insula Veghia. *Sempl. Par.* 202.

Expl. TAB. XXIII. f. a Flosculus cum semine, et pappi portione; *b* antherarum tubus cum filamentis corollæ insertis; *c* stylus; *d* semen.

SANTOLINA MARITIMA: *Linn. MSS. in Sp. Pl.* 1182. *Smith Fl. gr. Prodr. II. p. I.* 165 *Ten. Fl. neap. Seb. et Mau. Fl. rom.* 284. *Viviani pl. lig. cors. et sard. Herb. ATHANASIA maritima Linn. Sp. Pl.* 1182. *Mant. II.* 464. FILAGO maritima *Linn. Sp. Pl. ed. I.* 192. DIOTIS candidissima *Desfont. Fl. atl. II.* 261. *Decand. Fl. franc.* IV. 201. *Savi Bot. etr. III.* 145.

H. in littore Tripolitano.

