

*phyllus Pappus sessilis pilosus. Cum Tragopogone haud convenit, potius cum hoc genere, licet calyx et pappus sint diversi. W.*

\* 1418. H E D Y P N O I S.

*Gen. plant. ed. Schreb. n. 1243.*

*Recept. nudum. Cal. calyculatus. Pappus disci duplex, exterior obsoleto multifido; interior paleaceo 5-phyllo; radii margo membranaceus denticulatus.*

1. HEDYPNOIS *monspeliensis. W.*

*H. caule diffuso ramoso, foliis oblongis dentatis basi attenuatis sessilibus, squamis calycis fructigeri glabris. W.*

*Hyoseris (Hedypnois) fructibus ovatis glabris, caule ramoso. Sp. pl. 1138. Gouan. monsp. 416.*

*Lapsana fructibus subglobosis glabris, seminibus disci calyculato-papposis. Hort. upf. 246. \* Sauv. monsp. 83.*

*Lapsana calycibus fructus capitatis dehiscentibus, pedunculis incrassatis, floribus nutantibus. Hort. cliff. 387. Roy. lugdb. 131.*

*Rhagadioides calthae folio, calyce glabro. Vaill. act. 1721. p. 202.*

*Hieracium capitulum inclinans, semine adunco. Bauh. pin. 128.*

*Hieracium facie hedypnois. Lob. ic. 239.*

*Hedypnois annua. Tournef. inst. 478.*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 9. p. 106.*

*Französisches Röhrleinkraut. W.*

*Habitat in Europa australi. ☉ (v. f.)*

\* 2. HEDYPNOIS *mauritanica. W.*

*H. caule erecto ramoso, foliis oblongis subdentatis subcordatis amplexicaulibus, squamis calycis fructigeri alternis apice subsetosis. W.*

*Hyoseris mauritanica. Hortulan.*

*Mauritanisches Röhrleinkraut. W.*

*Habitat in Mauritania? ☉ (v. v.)*

Caulis glaberrimus semipedalis erectus ramosus, versus radicem subhispidus. Folia radicalia lanceolata basi attenuata remote dentata; caulina lanceolata cordata subdentata amplexicaulia margine pilis setosis brevibus remotis ciliata, ceterum glabra. Pedunculi filiformes longi sub flore parum incrassati uniflori. Calyx calyculatus, calyculo brevissimo, in flore fructigero ut in congeneribus angulatus, squamis glabris, alterius subapice setis brevissimis paucis obsitis, reliquis glabris. Corolla composita flosculi sex vel octo rarius decem latis ligulatus flavis dentatis. In centro floris decem ad duodecim flosculi apetalis staminibus apice violaceis. Pappus seminum marginalium dentatus, cum arista unica vel tribus versus latus exterius; seminum centralium setis capillaceis exterioribus brevibus, interioribus paleaceis longioribus compositus. W.

### 3. HEDYPNOIS rhagadioloides. W.

H. caule diffuso ramoso, foliis oblongis dentatis basi attenuatis sessilibus, squamis calycis fructigeri hirtis. W.

Hyoseris (*rhagadioloides*) fructibus ovatis pilosis, caule ramoso. *Sp. pl.* 1139. *Kniph. cent.* 5. n. 44.

Hyoseris cretica. *Cavan. ic.* 1. p. 32. t. 43.

Lapsana fructibus globosis pilosis, seminibus disci calyculato-papposis. *Hort. upf.* 246. \*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 9. p. 107.

Sichelsalatartiges Röhrleinkraut. W.

*Habitat in Europa australi.* ☉ (v. v.)

### 4. HEDYPNOIS cretica. W.

H. caule diffuso ramoso, foliis oblongis dentatis subcordatis amplexicaulibus, squamis calycis fructigeri glabris apice muricato-setosis. W.

Hyoseris (*cretica*) fructibus ovatis scabris, caule ramoso. *Kniph. cent.* 11. n. 59.

Lapsana fructibus ovatis scabris, seminibus disci calyculato-papposis. *Hort. upf.* 246. \*

*Houttuyn Lin. Pfl. Syst.* 9. p. 108.

Cretisches Röhrleinkraut. W.

*Habitat in Creta.* ☉ (v. v.)