

1626\*\*. LAGOSERIS *taurica*.

L. foliis runcinato-bipinnatifidis, calycibus villoso-tomentosis.

L. (*crepoides*) foliis runcinato-bipinnatifidis radicalibus, scapo ramoso. *Marsch. cent. plant. rar. rossic. I. t. 30. Catal. hort. gorenk. a. 1812. p. 34.*

*Crepis purpurea. Flor. taur. cauc. n. 1616. (cum synymo.)*

1627\*. HEDYPNOIS *persica*.

H. diffusa hirta, foliis dentatis basi attenuatis: caulinis cordato-amplexicaulibus, pedunculis incrassatis, calycibus undique piloso-hispidis.

H. persica. *Catal. hort. gorenk. a. 1812. p. 34.*

H. rhagadioloides. *Steuen in mem. soc. nat. cur. mosq. 4. p. 60.*

Habitat in Caucaso orientali, circa Derbentum. Floret Majo. ◎

*Differt ab H. monspeliensi statu nonnihil altiore, hispiditate omnium partium insigne, pedunculis calycem versus eximie incrassatis atque fistulosis, calycibus totis pilis paleaceis cooperatis. Semina marginis urceolo membranaceo acute denticulata coronata loco pappi; semina disci pappo paleaceo raro praedita. An satis distincta ab H. creticâ?*

1628\*. HYPOCHOERIS *canescens*.

H. foliis sinuato-dentatis glabris, canle ramoso folioso, pedunculis subsquamosis calycibusque pubescenti-canis. *Steuen in mem. soc. nat. cur. mosq. 4. p. 60.*