

Rhagadiolus rigidus. = *Rh. edulis* Gaertn.

Calathides presque sessiles. Akènes extérieurs, ordinairement 5, peu allongés à la maturité, notablement épaissis au milieu et brièvement subulés, inclus dans des folioles lisses, à peine plus longues qu'eux; akènes du disque hérissés, fortement enroulés, bien plus courts que les autres. Feuilles plus ou moins divisées. Tiges raides. Plante glabre. — Fl. avril, mai.

Terrains schisteux : Garrouban.

Dans *R. stellatus* ou *edulis* Gaertn., les akènes extérieurs, au nombre de 8, sont longuement subulés, non épaissis au milieu et sont beaucoup plus courts que les folioles qui les embrassent.

Hedypnois sabulorum. = *H. polymorphus* H.

Péricline fructifère ovoïde, oblong (et non globuleux comme dans les autres espèces), à folioles étroites muriculées dans toute leur longueur, peu arquées, laissant voir les akènes dans leurs intervalles. Akènes luisants, couverts de courtes écailles scarieuses appliquées. Aigrettes du centre formées de longues soies blanches, alternant avec quelques poils sétacés. Pédoncules allongés, grêles, très légèrement épaissis vers le haut, finement striés. Tiges grêles, dressées ou un peu diffuses, à rameaux étalés. Feuilles ciliées ou peu hispides, souvent aiguës et subentières. Racine annuelle. — Fl. avril.

Terrains sableux du Tell : Oran, Mostaganem.

Cichorium callosum. = *C. parviflorum* Lag.

Calathides 1-4 sessiles à l'aisselle d'un long pédoncule fistuleux, enflé, uniflore. Péricline à folioles extérieures lancéolées-aiguës, à partie herbacée courte et à peine décurrente sur la base indurée, les intérieures bien plus longues, linéaires, obtuses et trois d'entre elles ayant à la base une gibbo-