

6. C. DROSCORIDIS (L. sp. 1133.) foliis radicalibus lyrato-runcinatis, caulinis hastatis lanceolatis, inferioribus dentatis, caule erecto, involucris tomentosis, fructigeris subrotundo-ovatis angulosis. (I) in siccis secùs vias Alsatiæ. — Fl. fr. 4. p. 40. Ic. rar. t. 18. *Gatyona globulifera* Cass. (v. s.)
7. C. TECTORUM (L. sp. 1135. non fl. fr.) foliis glabris sinuato-pinnatifidis, superioribus sagittato-linearibus integris margine subrevolutis, seminum oblongo-attenuatorum costis scabris apice muricatis. (I) in campestribus Alsatiæ et probabiliter Galliæ totius. — Fl. fr. 5. p. 448. (v. s.)
8. C. LACHENALII (Gochn. diss. t. 3.) foliis glabris, radicalibus spathulato-lanceolatis dentatis, superioribus linearibus margine revolutis integerrimis, caule gracili erecto paucifloro, seminum costis aspero-muricatis. (I) in arvis Alsatiæ. — Fl. fr. 5. p. 449. (v. s.)

LXXV. TARAXACUM *Hall. helv.* p. 23. *Juss. gen.* 169.

Involucrum duplex squamis exterioribus brevibus sæpiùs patulis; receptaculum nudum; pappus stipitatus pilosus. — Scapi uniflori.

1. T. PALUSTRE (DC. fl. fr. 4. p. 45.) foliis lanceolatis sinuato-dentatis glabriusculis, involuci exterioris adpressi squamis ovatis subacuminatis. 2f in paludosis et pratis humidis. — *Hedypnois paludosa* Scop. carn. 2. t. 48. (v. v.)
2. T. OBOVATUM (DC. rapp. voy. 2. p. 83.) foliis obovatis obtusis vix retro-dentatis, involuci exterioris patuli squamis lanceolato-ovatis. 2f Monspelii et in Galloprovinciâ. — *Leontodon obovatus* W. hort. berol. t. 47. — J. Bauh. hist. 2. p. 1037. f. 2. (v. v. DC.)
3. T. LÆVIGATUM (DC. cat. monsp. 49.) foliis runcinato-pinnatifidis, laciniis valde inæqualibus, majoribus reflexis basi subincisis, involuci exterioris patuli squamis lanceolatis. 2f in rupestribus apricis passim. — Fl. fr. 5. p. 450. — Barr. ic. t. 237. An à sequente satis distinctum. (v. v.)
4. T. DENS-LEONIS (Desf. atl. 2. p. 228.) foliis runcinatis glabris, laciniis lanceolatis dentatis, involuci exterioris reflexi squamis linear-lanceolatis. 2f ubique in pratis. — Fl. fr. 4. p. 45. *Leontodon Taraxacum* L. Bull. herb. t. 217. — Moris. s. 7. t. 8. n. 1. Tres præcedentes species ut hujusce varietates habent cl. St.-Amans et Bentham. (v. v.)

III PAPPUS PLUMOSUS.

LXXVI. HELMINTHIA *Juss. gen.* 170.

Involucrum duplex, interius squamis 8 æqualibus, exterius squamis 5 foliaceis laxis; semina transversè striata; pappus plumosus pedicellatus.

1. H. ECHIOIDES (Gærtn. fruct. 2. t. 159. f. 2.) involuci exterioris squamis latis ovato-cordatis subspinosis. (I) in arvis, ad vias. — Fl. fr. 4. p. 58. — Lob. ic. t. 577. f. 2. (v. v.)
f. *mollis*, involuci squamis subinermibus. — In pratis salsis circà Arelatem detexit cl. A. Richard. (v. s.)
2. H. SPINOSA (DC. fl. fr. 4. p. 58.) involuci exterioris squamis lanceolatis margine apiceque spinosis. — In Pyrenæis ex herb. Lemonnier. Ic. rar. t. 21. (v. s.)

LXXVII. PICRIS *Juss. gen.* 170.

Involucrum calyculatum, calyculi squamis linear-lanceolatis; receptaculum nudum; semina transversè striata, pappus plumosus sessilis vel subsessilis.

1. P. HIERACOIDES (L. sp. 1115.) caule scabro ramoso-divaricato, foliis asperri-