

PICRIDE.

PICRIS.

Picris. Juss. Gærtn. Lam. *Pieridis spec.* Linn.

Calathida subimbricata foliolis apice patentibus et ad basim sæpe liberis squarrosa. Receptaculum faveolatum; akenia longitudinaliter substriata, sed striis transversis valde aspera, pappo sessili plumoso. *Herbæ foliis hispidis, pilis furcatis; caulis ramosus similiter hirtus.*

1. *P. hieracioides*, hirta, caule firmo cylindrico striato ramoso, ramis patentissimis, foliis radicalibus lanceolato-obtusiusculis margine sinuatis, supremis brevioribus semiamplexicaulibus integris aut subintegris, floribus majusculis pedunculo solitariis subcorymbosis, calathida squarrosa hirta. *Linn. spec.* 1115.

a. *P. glomerata* N. caule simplici aspero rigido, foliis lanceolatis subsinuatis, racemis florum axillaribus abbreviatis.

Toute la plante est couverte de poils courts, rudes et crochus; sa tige est un peu roide, cylindrique, striée, haute de quatorze à dix-huit pouces au plus, et divisée presque dès la base en rameaux très-ouverts qui se redressent, vers le sommet. Elle se termine par un corymbe irrégulier composé de fleurs solitaires, grandes, de couleur jaunée et légèrement rougeâtre; leur calathide est hérissée de poils et les folioles se roulent au sommet. La variété est fort remarquable parce que ses fleurs sont ramassées le long de la tige en grappes axillaires. Commune à la fin de l'été dans les lieux incultes. ¶.

2. *P. pauciflora*, præcedente gracilior pariterque hirta, caule erecto ramoso, ramis paucis erectis, foliis radicalibus sinuatis, caulinis amplexicaulibus oblongis subintegris, floribus luteis paulo minoribus, calathida pilosa squarrosula. *Wild. Spec.* 3, p. 1557. *Cræpis Sprengeriæna*. *All. Ped.* n° 810.

Cette espèce diffère de la précédente par sa tige et ses rameaux plus grêles; ceux-ci sont moins nombreux, moins ouverts; ils portent une, deux ou trois fleurs plus petites que celles du *Picris hieracioides* et dont la calathide est un peu moins squarreuse; ses feuilles ont la même conformation, seulement les caulinaires sont plus embrassantes. On la trouve à Montmorency. Assez rare. ○.

HELMINTHIE.

HELMINTHIA.

Helminthia. Juss. Gærtn. *Picridis spec.* Linn.

Calathida distincte duplex; exterior 5-phylla ampliata, interior duplici serie polyphylla, infimis foliolis alternis multo minoribus, supremis au-

tem lanceolato-acuminatis piloso-aristatis. Receptaculum nudum sublæve; akenia oblongo-adpressa transversim striata, pappo graciliter stipitato plumoso. *Herbæ asperifoliæ; caulis ramosus subechinatus.*

1. *H. echioïdes*, subaculeata, caule crasso fistuloso erecto ramoso, foliis radicalibus subsinuatis cæteris latis oblongis amplexicaulibus undique aculeatis, floribus magnis luteis, foliolis calathidæ exterioris cordatis spinosis, foliolis autem calathidæ interioris lanceolatis aristatis. *Gærtn. Fruct. 2, p. 368, t. 159, fig. 2. Lam. Illustr. t. 648. D. C. Fl. fr. n° 2976. Picris echioïdes. Linn. spec. 1114.*

Sa tige est haute de trois pieds, épaisse, fistuleuse, cylindrique, marquée de stries et garnie de poils très-durs, piquans, qui deviennent trifides et crochus au sommet; elle se divise dans sa longueur en rameaux nombreux qui sont chargés de corymbes de fleurs jaunes, dont les pédoncules sont fort hispides, et les calathides comme aiguillonnées. La calathide interne a ses folioles voisines des graines, prolongées en une pointe aristée. Commune à la fin de l'été sur le bord des fossés et dans les haies. ☉.

2. *H. pratensis* *N.* humilior et præcedente mitior, caule erecto ramoso aspero nec aculeato, foliis asperis angusto-lanceolatis margine sinuato acutis, caulinis amplexicaulibus integris, floribus subcorymbosis luteis quam in præcedente minoribus, calathida utraque intersece æquali tantum hirta nec aristata.

Cette plante s'élève à la hauteur du *Picris hieracioides*, auquel on peut la comparer pour la rudesse des feuilles et des tiges, et avec lequel on pourrait peut-être la confondre avant l'époque de la fleuraison. Sa tige est haute de dix-huit pouces à deux pieds, dressée, à peu près cylindrique, et divisée presque dès la base en rameaux nombreux assez courts, dichotomes. Les fleurs sont plus petites que dans l'*Helminthia echioïdes* et terminent les rameaux supérieurs de la plante; elles ont des pédoncules peu hérissés de poils, et leurs calathides sont égalés entre elles, hispides; l'intérieure a ses plus grandes folioles étroites, oblongues, nullement aristées, mais garnies sur le dos de poils blanchâtres. Elle croît en été, dans les prés, en Brie. Rare. ☉?

SCORZONÈRE.

SCORZONERA.

Scorzoneræ spec. Linn. Juss. Gærtn.

Calathida oblonga imbricata, squamis basi dilatatis margine membranaceis. Receptaculum nudum punctatum; akenia sessilia lævigato-striata, pappo substipitato plumoso. *Herbæ foliis alternis.*

1. *S. hispanica*, radice longissima extus nigricante, caule ramoso 5-6-floro