

beträgt. Pappus haarförmig, etwas über 3<sup>mm</sup> lang, Haare desselben unter der Vergrößerung fein gezähelt, unten gelb, an der Spitze weiss.

In August und September in Simen beobachtet.

## Heterachaena Fresen.

Genus novum.

Capitulum 9—10-florum. Involucrum cylindraceum 5-phyllum, squamis brevibus margine scariosis calyculato-imbriatum. Rhachis ebracteolata. Achaea eodem capitulo heteromorpha (et heterochroa), 7—8 peripherica compressa, oblongo utrinque attenuata, apice sensim fere in rostrum angustata, longitudinaliter striata, brevissime in stratis aculeolata, 1—2 centralia subtrigona apice attenuata laevi. Pappus pilosus pluriserialis vix denticulatus mollis albus.

Herba ramosa pedalis, foliis caulinis amplexicaulibus, pedunculis filiformibus.

## Heterachaena massauensis Fresen.

### Beschreibung.

Wurzel walzig, 1<sup>cm</sup> dick, nach unten verschmälert, etwas gebogen, in einiger dickere und mehrere haarförmige Fasern sich theilend, etwas schief hinabsteigend. Stengel kahl, stielig. Die untersten Blätter rundlich-verkehrt-eiförmig, in einem häufigen Blattstiel verschmälert, buchtig-gezähnt, fast leierförmig, 2—2½<sup>cm</sup> lang, oben am breitesten Theil bis 1<sup>cm</sup> breit, die oberen und obersten an der Basis umfassend, am Rande gewimpert, fadenförmig, Abschnitte von kurz-lanzettlicher oder dreieckiger Form, horizontal gerichtet, gezähnt, Zähne in weisse steifliche Spitzchen ausgehend, Oehrchen rundlich, buchtig-gezähnt, die oberen Blätter an dieser Stelle am breitesten. Blüthenstiele dünn, fadenförmig, kahl; Blüthenköpfchen cylindrisch, 3½—4<sup>cm</sup> lang, 9—10blüthig, in Rispen gestellt, kleine rauhhäutige Schuppen an dem Abgangspunct der Blüthenstiele. Involucrum kahl, äussere kürzere Schuppen desselben rundlich-eiförmig und eiförmig, spitz, mit grünem Mittelstreifen und eben so breitem weissem Hastrand, die mittleren lineal-lanzettlich, gleichfalls mit einem weissen Rande versehen, etwa halb so lang als die innersten, diese zu 5, line-