

bus, seminiibus majoribus aliisque notis abunde diversum. Hab. in montibus et in subalpinis Somchetiae, Iberiae, Taliusch. 24

GLAUCIUM ELEGANS. G. annum, glaucum, glabrum v. setulosum; foliis caulinis latissime cordatis suborbiculatis sinuato—dentatis; siliquis tuberculato—scabris.—Flores parvi, quam in G. corniculato minores, petalis luteis basi rubris; siliquae tenues, incurvae et apice non raro circinatae.—Facile dignoscitur a reliquis speciebus hujus generis glabritie, foliorum caulinorum latitudine et florum parvitate.—Hab. in Persia boreali. ○

GLYCYRRHIZA? TRIPHYLLA. G. lepidoto—glandulosa; caulis ramosis ima basi frutescentibus; stipulis lanceolatis caducis; foliis trifoliolatis; foliolis obovatis retusis; spicis axillaribus elongatis longe pedunculatis; leguminibus turgidis oblongo—ellipticis aculeatis.—Species singularis, ob flores adhuc ignotos haud rite collocanda.—Hab. in litore orientali maris Caspii, locis montosis. 24

GYSOPHILA STRICTA. Hab. non solum in regionibus altaicis, sed etiam in provincia transcaucasica Karabagh et in Gilan.

HEDYSARUM SETIGERUM Turcz. (Mss.) H. (*Echinolobium*) perenne, caulescens v. subacaule; foliolis 5—8—jugis ellipticis oblongis supra glabriusculis, subtus argenteo—sericeis; dentibus calycinis lanceolatis tubo duplo longioribus, alis longe brevioribus; carina vexillum aequante, alas paulo superante; lomenti articulis ellipticis rugosis villosis setosisque.—Variat caulis abbreviatis vel elongatis, spicis brevioribus compactis vel elongatis laxis, floribus purpurascensibus vel albidis. Articuli lomenti junioris pro more Urariae plicato—retrofracti.—Hab. in Dahuria. 24

HERACLEUM TRACHYLOMA. H. (*Sphondylium*) foliis utrinque scabriusculis pinnatisectis: segmentis incisis lobatis acutis, terminali cordato trifido v. tripartito: lobo intermedio cuneato; fructibus obovatis v. obovato—suborbiculatis in disco margineque setosis pilosisque.—Affine *H. aspero*, sed fructibus bene distinctum.—Hab. in montibus provinc. Karabagh et Nakitschiwan. ○

HETERACIA F. et M. Galathidium multiflorum, octopartitum, basi squamosum. Clinanthium planum, nudum. Achevia exteriora compresso—tetragona, suberoso—corticata, apice truncata et mucronata, pappo destituta; centralia teretiuscula apice truncata pappoque pluriseriali capillaceo serrulato—scabro longissime stipitata terminata.

H. Szovitsii. Planta annua ex *Lactucearum* tribu, humili, glabra, ramosa, foliis sagittatis runcinatis, flosculis flavis. Hab. in campis salsis aridis prope Nakitschiwan.

HYACINTHUS PARADOXUS. H. foliis glabris linearibus lanceolatisve (strictis v. laxis); bracteis brevissimis; floribus spicato-racemosis coriaceis campanulatis semisexfidis: lobis patulis; filamentis setaceis tubo supra medium insertis; (antheris flavis); ovario globoso.—*H. pallenti* affinis, attamen distinctus floribus coriaceis intense coeruleis (in illo hyalinis membranaceis), filamentis perianthio supra (in illo infra) medium tabi insertis, antheris flavis subexsertis (in illo inclusis coeruleis), ovariis majoribus et capsulis aperte alatis.—Occurrit *monstrositas* floribus subglobosis eorumque lobis conniventibus, filamentis dilatatis et antheris cassis.—Hab. in montibus provinciae Gurieł, versus pontum Euxinum.

24

INULA MULTICLAUBIS. I. (*Limbarda*) radice lignescente multicanali; caulis ramosis: ramis patentibus elongatis subnudis moncephalis; foliis caulinis sessilibus anguste oblongis v. sublinearibus obtusis integerrimis subundulatis margine villosis, inferioribus basi attenuatis; calathidii squamis linearis-lanceolatis pubescentibus adpressis, exterioribus apice patulis. *I. saxatili* affinis *Eichwald Plantar. novar. etc. fasc. I p. 3.*—Species nostra, neglectis aliis notis, ab *I. saxatili* Lam. (*Chiliadeno camphorato Cass.*) pappo simplici uniseriata distincta.—Hab. in litore orientali maris Caspii, locis montosis.

24

LASTOSPORA LATIFOLIA. L. tomentoso-cana; caule erecto folioso polycephalo; foliis sessilibus oblongis acutis nervosis margine minutim crispati; calathidii squamis acutis. *Scorzonera nervosa* *Trevir. Delect semin. h. Bonnens. 1833* (non Persoon). Affinis *L. ensifoliae*, ab illa tamen facile dignoscitur herba tomento brevi (non lanugine elongata decidua) vestita; foliis latioribus breviter acutatis (non longissime caudato-acuminatis) aliisque notis.—Hab. in montibus Persiae borealis et in Armenia.

24

LEPIDIUM CUMINGIANUM. L. perenne, subpubescens; caule erecto ramoso; foliis radicalibus indivisis v. pinnatifolatis: lobis oblongis serratis, terminali majori, caulinis sublinearibus subsagittatis subintegerrimis; floribus tetrapetalis dianthris; siliculis ellipticis