

p. 98 n° 624. *Carduncellus eriocephalus* Boiss.

D. i. (Djebel Ekhfen v. p. 799.)

» 98 » 630. *Hedypnois rhagadioloides* (L.) Willd.

M. p. (Broullous; El-'Arîch Aschers. v. p. 799.)

» 98 » 631. *Koelpinia linearis* Pall. **D. i.** (Wâdy-el-'Arîch v. p. 799.)

» 98 » 634. *Leontodon hispidulus* (Del.) Boiss.

D. i. (Wâdy-el-'Arîch v. p. 800.)

» 99 » 639. *Urospermum picroides* (L.) Desf.

M. ma. (Mariout Blomf., Aschers.)

» 99 » 642. *Pour Scorzonera mollis* M. B. lisez :

Scorzonera Schweinfurthii Boiss. Boiss. Suppl.
Fl. Or. 320.

Obs. Feu M. BOISSIER avait distingué la plante d'Égypte de celle de MARSCHALL : « tubere multo crassiore tripollicari diam. bipollicari, indumento appressiore stellato, foliis latioribus obtusis inferioribus dilatatis, capitulis brevioribus latioribus, achaeniis omnibus valde muricatis ».

» 99. Après le *S. hispanica* L. intercalez :

1299. **Heteroderis aegyptiaca** Schweinf. sp. n.

D. a. sept. (Plateau de la Galâlah du Nord [1150 mètres] dans le Wâdy Qorn-el-Kabch et dans le Wâdy Ghisly Schweinf.)

Caules decumbentes, pubescentes et parce hispidi; folia rosulata glabra vel ad nervum subtus hispidula, oblongo-spathulata, sinuato-dentata ad sinuato-lobata, remotiuscule denticulata, dentibus et denticulis eximie callosis; caulina 1—2 semiamplexicaulia oblongo-lanceolata ad linearia; capitula 2—5 mediocria subcorymbosa breviter tomentello-pedunculata cernua, oblonga, 15—20 flora; calyculi phylla subpatula triangularia acuta, late scarioso-marginata glabriuscula, involuero subquadruplo breviora; involucri inferne canescentis basin versus atropurpurascentis phylla medio usque ad apicem setulis (in nervo basin versus in-

crassato biseriatis) hispida, seta terminali saepe incrassata, rufescente superata; fructus prismatici basi attenuata disci praesertim in costis tuberculis apicem versus abrupte auctis ibi arrectis, aequae latis ac longis hinc inde squamuloso-confluentibus muricati; disci rostro $2\frac{1}{2}$ —4 plo longiore et pappo fructui aequilongo superati, radii laeviusculi rostro aequilongo pappo evanescente.

Species obiter inspecta Zollikoferiam glomeratam (Cass.) Boiss. quodammodo referens; ab H. pusilla Boiss. (Boiss. III. 794. Kotschy pl. Pers. 850), cui proxima, differt foliis minus divisis et minus distincte denticulatis, capitulis majoribus, fructibus brevius muricatis longius rostratis.

p. 99 n° 643. *Sonchus oleraceus* L.

M. p. (El-'Arîch v. p. 800.) **D. i.** (Ismailia Schweinf.)

» 99. Après le n° 645 intercalez :

1300. *S. arvensis* L. var. *uliginosus* (M. B.) Rupr. Syn. S. a. β . *laevipes* Koch. Boiss. III. 798.

N. d. (Menzaleh, bord des champs Schweinf.)

» 100 n° 651. *Zollikoferia angustifolia* (Desf.) Coss.

D. i. (Wâdy-el-'Arîch v. p. 800.)

» 100 » 655. *Z. glomerata* (Cass.) Boiss.

M. p. (Qatiyeh; El-'Arîch v. p. 800.)

» 101 » 658. Effacez le *Reichardia picroides* (L.) Roth. La plante d'Alexandrie récoltée par M. BARBEY est le *R. tin-gitana* (L.) Roth.

» 101. Après le n° 661 intercalez :

1301. *Crepis aspera* L. Boiss. III. 857.

M. p. (El-'Arîch v. p. 800.)

» 101 n° 665. *Campanula sulphurea* Boiss.

M. p. (A partir du Bîr-Abou'l 'Efeyn vers l'Est Aschers.)

D. i. (Djebel Ekhfen v. p. 800.)