

## **HEYWOODIELLA Svent. et Bramwell; genus novum \***

(Compositae - Liguliflorae - Cichorieae - Crepidineae)

Capitula medioeria bracteis involucralibus 50 - 60, 5 - serialibus, herbaceis, dorso hirsutis, post fructificationem deflexis. Receptaculo convexo superficie mammilloso - perforato, paleaceo paleis caducantibus. Achaeniis ferè conformibus, tenuibus breviter rostratis, quinque-costatis costis transverse striato-rugulosis, pappo sessili, simplici e setis 12-14 leviter inaequilongis, plus-minusve undulatis, breviter aculeatis e setis pergaminaceis longioribus sat distanter intermixtis. Suffrutices semper virentes, plus-minusve laticiferi, caulis adpressis foliis rosulatis. — Typus generis est species *Heywoodiella oligocephala* Svent. et Bramwell.

### ***Heywoodiella oligocephala* Svent. et Bramwell; nova spec.**

Planta suffruticosa, depressè expande multicaulis, caulis leviter laticiferis latice aquoso, albo-lutescenti; simplicibus vel rariore furcatis, infernè vaginarum foliorum vetustorum residuis plus minusve tectis, supernè foliis siccis vestitis; foliis temporariis laete viridibus, lucidis, crassiuseculis, valde inaequilongis 30 - 80 mm long., 15 - 30 mm lat., lanceolatis, versus basin plus-minusve linearis-subpetiolatis apice sub-acutis, margine grosse dentata simul leviter undulato-crispata, anverse parciter sparsisve molliter verruculoso-aculeatis, laevis cum rhachide breviter setoso ex adverso, omnibus in rosulam planam congregatis; caule florifero erecto, 3 - 8 cm alt. (plus-minusve longitudine foliorum exteriorum aequante); generaliter 1 - 2-cephalo (rariore 3), strigoso, 1 - 2-foliato; pedunculis parce hirsutis, infra capitula sat incrassatis cum 1 - 3 bracteis linearis-squamiformibus ornatis. Capitula medioeria, poculiformia, ca. 15 mm long., bracteis involucralibus acutati-linearibus, dorso densè nigro-hirsuto, post florationem deflexis. Ligulae exteriore 15 - 20 mm long., limbo duplo longiore quam tubo, irregulariter 5-fido, luteo. Receptaculum 5 - 7 mm diam., dense paleaceum, paleis linearis-setaceis, achaenia leviter superantibus, 9 - 11 mm long., 1 mm lat., argentei-transparentibus, a media parte superiori in longam setulam filiformem

\* In honorem cl. Prof. Dr. phil. V. H. HEYWOOD, florae hispanicae meritissimi investigatoris nominamus.