

Subtrib. 3. HIERACIÆ. *Cass.*PRENANTHES = *P. et Nabalus. Cass.*686 *purpurea. L. Ț. 7, 8 In rupibus umbrosis Luxemb. (Tin!)*HIERACIUM. *Lin. Cass.*§. 1. HIERACIOTYPUS. — *Periclinii phylla adpressa.**a. Stolones repentes. Pilosella.*687 *Pilosella, L. Ț. 5—7. In pascuis siccis ubique!**β. geminiflorum.*688 *dubium, L. Ț. 5—7. In graminosis humentibus!**α. uniflorum.**β. pluriflorum.**γ. auriferum.*689 *cæspitosum : stoloniferum ; foliis obovato-lanceolatis, subintegris, obtusis, scapisque hirtis ; corymbo multifloro, demùm elongato ; pedicellis villosis glandulosis ; pericliniis hirtis. Ț. 5—7. Ruderatis Tornaci!*690 *aurantiacum, L. Ț. 6, 7. In pratis sylvat. Leod. (Mich.)**b. Stolones nulli ; plantæ scapigeræ.*691 *præaltum, Vill. Ț. 6. In valle Rhenanâ. (Tin!)*692 *præmorsum, L. Ț. 5—7. Sylv. mont. Eifliæ. Luxemb. (March! Tin!)**c. Stolones nulli. Caulis paucifolius.*693 *murorum, L. Ț. 5—8. In muris et sylvaticis!*694 *maculatum, Sm. Ț. 5—7. In rupibus et montosis!**β. nudicaulis = H. auricula Hoor!**d. Stolones nulli. Caulis foliosus.*695 *sylvaticum, Gouan. Ț. 7, 8. In sylvis calcareis!*696 *paludosum, L. Ț. 6—8. In pratis sylvaticis humidis!*697 *prasinum ; caule folioso basi lanato ; foliis prasinis infernè villosis inferioribus oblongo-lanceolatis remote dentatis, summis ovatis acuminatis semiamplexicaulibus ; pedunculis pulverulentis ; pericliniis hirtis. H. glaucum, Lej! Ț. 6, 7. Mont. Verv. (Lej!) — Var. H. villosi vel cerinthoidis?*698 *rubricaulis : caule piloso simplici, supernè ramoso ; foliis sessilibus cordato-ovatis acuminatis, basi dentatis, villosis, ramealibus integris ; calathis racemoso-corymbosis, pilosulis. — H. prenanthoides, Lej! nec. Vill. Ț. 8, 9. In collibus schistosis. (Lej!)*§. 2. HIERACIOIDES, *Moench.*699 *Sabaudum, L. Ț. 8, 9. In nemorosis!*