

Corolla 6–6.5 mm longa, lobis revolutis. Pappi scabri 4 mm longi. Stamina exerti. Styli bifidi exerti.

Hab. in Korea austr.: in silvis Chirisan 800–1000 m. VIII. 1912 (T. MORI n. 359, 360) VII. 1913 (T. NAKAI n. 676).

130) **Carpesium glossophylloides**, NAKAI.

Affine *C. glossophyllo*, sed ex quo capitulis fere duplo majoribus differt.

Elatus divaricato-ramosus crispulo-ciliatus. Folia caulina lanceolata crenata subsessilia usque 15 cm longa utrinque minute et sparsim ciliolata. Caput ad apicem rami terminale nutans, foliis involucretis 2–3 et sensim in bracteas transformantibus suffultis. Bracteæ exteriores apice virides pubescentes, interiores scariosæ glabræ. Ovarium 3 mm longum angustum ad apicem constrictum ubi glandulosum. Flos 2 mm vix attingit.

Hab. in herbidis Koreæ mediæ. 1902 (T. UCHIYAMA) 1908 (N. OKADA).

131) **Cirsium mokchangense**, NAKAI.

Radix fusiformis fasciculata. Folia radicalia pilosa, petiolis 21 cm longis, lamina ovata, margine apiculato-serrulata. Caulis crispulo-serrulatus. Folia caulina inferiora ovata longe-petiolata, superiora ovato-lanceolata subsessilia, caput unicum terminale diametro 1.3 cm. Involucri squamæ 6 seriales, extremæ intimis triplo breviores. Flores intense purpurei.

Hab. in Korea austr.: circa Mokchang. XI. 1900 (T. UCHIYAMA.)

132) **Hieracium coreanum**, NAKAI.

Radix perennis. Caulis usque 2 pedales glaber. Folia radicalia longe-petiolata late-lanceolata v. ovato-lanceolata supra sparsim hirtella, infra secus venas pilosa, margine argute reflexo v. patentim serrata. Folia caulina late-lanceolata amplexicaulia. Caput 1–3. Involucri squamæ biseriales exteriores 5–7 mm longæ basi pilis nigris sparsis, interiores glabræ v. apice margine pilosis 12 mm longis. Corolla aurea 18 mm longa. Ligula 3 mm lata apice distincte dentata. Stigma filiforme bifidum.

Hab. in silvis Laricis pede montis Paiktusan. VIII. 1913 (T. MORI n. 53) VIII. 1914 (T. NAKAI).

133) **Ligularia coreana**, NAKAI.

Affinis *L. japonicæ*, differt exqua pedunculis gracilioribus, involucri squamis numerosis et angustioribus, radiis angustioribus.

Elata. Folia caulina petiolis basi dilatatis ut in *Angelica*, inciso trifida, lobis mediis trifidis, lateralibus bifidis, omnibus grosse arguteque incisa, secus venas et margine ciliolata. Inflorescentia corymboso-paniculata. Flores conspicui diametro 7 cm. Involucri squamæ 12, uniseriales imbricatæ 15 mm longæ. Ligulæ 3 cm longæ aureæ 3-6 mm latæ. Flores disci plus minus fuscentes. Pappi fusco-rubrescentes setacei.

Hab. in Korea sept.: monte Musanryöng VII. 1909 (K. Jô n. 400).

134) **Saussurea Hoasii**, NAKAI.

Rhizoma repens. Caulis terminalis angulatus. Folia omnia elongato-triangularia glabra secus marginem ciliolata attenuata argute-serrata, sæpe secus caulem decurrenti-alata, suprema sessilia. Flores axillares et terminales corymboso-racemosi 3-4. Caput ovatum 7-10 mm latæ. Bracteæ sessiles atropurpureæ, extremæ ovatæ, intimæ subulatæ. Flores purpurei.

Hab. in silvis Laricis pede montis Paiktusan. VIII. 1913 (T. MORI n. 54. 56) VIII. 1914 (T. NAKAI).

135) **Senecio Imai**, NAKAI.

Affinis *S. campestris*, sed ramosus et fere glaber. Caput est minus.

Caulis usque 2.5 pedales ad apicem ramosus. Folia elongato-lanceolata ad petiolem attenuata glabra, margine undulata, caulina superiora sessilia. Flores corymboso-umbellati. Pedicelli pilosi. Involucri squamæ glabræ 4-5 mm longæ uniseriales angustæ. Ligulæ flavæ involucri duplo superantes.

Hab. in Korea sept.: in herbis Pyeng-yang. VI. 1911 (H. IMAI) V. 1914 (T. NAKAI).