

*Homage au vicomte
C. Arvet-Touvet*

SPICILEGIUM

RARIORUM VEL NOVORUM

HIERACIORUM

PRÆCIPUE

Americanorum et Europæorum

AUCTORE

Casimir J.-M. ARVET-TOUVET



GRENOBLE

IMPRIMERIE ET LITHOGRAPHIE VEUVE RIGAUDIN

8, rue Servan, 8

1881

Verbasciformia.

H. Ecuadorensis Sp. N. Hypophyllopodum aphyllpodum ve, eriopodum; caulis foliosus, cano-floccosus, inferne longissime dense que barbato-villosus, pilis simplicibus, apice subnudus, glanduliferus; folia, ut in *Verbascis*, subtus tomento denso, cano-floccoso incrassata, supra subtus que plus minus villosa, margine sinuato et inæqualiter denticulata, dentibus mucronatis; rosulraum sterilium ovato-lanceolata, breviter in petiolum contracta, quasi ut in *Pulmonaria affini* Jord.; caulina ima inferiora, sub anthesi destructa; insequentia in petiolum latum attenuata; media sessilia, subam plexicaulia; suprema decrescentia, passim acuminato-acutissima; anthela corymbosa, glandulifera et cano-floccosa; involucria parva, ovoideo-cylindrica, squamis attenuato-acutis subacutisve; ligulæ luteæ, profunde et inæqualiter fissæ, dorso pilosæ, apice glabræ; achenia brevissima (1-1 1/2^{mm} longa) columnaria, utrinque truncata, basi vix attenuata, striata, matura atra, margine integro costas supereminente instructa, pappo sordido; achenia ut in grege *Accipitrinellarum* Fries; radix obliqua, crassa, præmorsa, tuberiformis, fibris sat crassis, descendentibus instructa.

In Andibus Ecuadorensibus coll. R. Spruce 1857-1859 n° 5981. v. s. sp. in hb. De Cand. et in hb. Boissier.

Cette plante, par sa villosité très longue, en forme de barbe ou de crinière soyeuse, par le *tomentum* épais de la face inférieure des feuilles, semblable à celui de certains *Verbascum* et par sa panicule corymbiforme et glanduleuse, formée de petits capitules, ne peut être comparée à aucune autre espèce du genre. Elle peut servir de type pour un groupe nouveau (*Verbasciformia*) très distinct, par les caractères indiqués, de tous ceux admis ou créés par Fries et qui se placerait à côté des *Accipitrinella* par la forme de ses achenes.

Accipitrinella Fries l. c.

H. cynoglossoides Sp. n. ? *H. Scouleri* Hook var. ? *cynoglossoids*. Aphyllpodum; caulis strictus, usque ad apicem, inferne dense, superne laxè foliatus, setoso-hispidus, setis basi bulboso-incrassatis, pilis paucis, brevibus, glanduliferis intermixtis; folia dense setoso-hirsuta, integerrima vel glanduloso-denticulata, linguato-lanceolata, subacuta, suprema ve acuta; inferiora in petiolum alatum sensim angustata, reliqua sessilia; anthela subcontigua, vulgo reducta, racemoso-capitata (denique subthyrsoidea ?) bracteata, basi