

sus, stipitatus. Sem. transversim striata.

1. *hieracioides*, caule erecto scabro, fol. amplexicaulibus lanceolatis dentatis, floribus corymbosis, calyce exteriore laxo. Willd. Sp. III. p. 1556. Engl. bot. t. 196. Lam. ill. t. 648. f. 3. Hab. in versuris agrovum. Pappus subsessilis. Flor. autumno. ♂

2. *japonica*, caule erecto hispido, fol. sessilibus pilosis lanceolatis dentatis, flor. paniculatis, cal. hispido : exteriore adpresso. Willd. Thunb. Jap. p. 299. Hab. in Japonia in montibus Fakoniae.

3. *aculeata*, caule erecto strigoso-aculeato, fol. elliptico-lanceolatis dentatis, flor. corymbosis, calyce hispido, exteriore laxo. Willd. Vahl. symb. 2. p. 89. Desf. atl. 2. p. 221. Habit. in collibus inculti Barbariae. ♂

4. *sprengeriana*, caul. ramoso varicato folioso, fol. amplexicaulib. oblongis repandis hispidis. L. sub Hieracio. Crepis sprengeriana. Willd. p. 1598. Moris. hist. 3. s. 7. t. 5. f. 17. Hab. in Lusitania et Italia. ◎

\* *pauciflora*, caule erecto hirsuto, fol. lanceolatis sessilibus denticulatis, pedunc. elongatis incrassatis, calyce hirsuto. Decand. Flor. franç. 4. p. 57. P. sprengeriana. Pour. enc. 5. p. 310. P. pyrenaica. Gaertn. de fr. 2. p. 366. t. 158. f. 2. Hab. in Gallia australi, in Pyrenaeis, Pedemonti. A priori satis diversa ?

5. *Rhagadiolus*, fol. integris amplexicaulibus oblongis, calycibus interioribus toruloso-articulatis hispidis : foliol. cymifloribus. L. Crepis Rhagadiolus. Jacq. Schoenbr. 2. p. 9. t. 144. Hab. in Hispania prope Malagam. Fol. superiora subsagittata. Cal. pili apice clavati. J. ◎

6. *asplenoides*, caule adscendente scabro, fol. oblongo-lanceolatis obtusis sinuato-pinnatifidis, pedunc. elongatis incrassatis, cal. scabro : exteriore reflexo. Willd. Desf. atl. 2. p. 222. Leotodon muricatum. L'Herit. stirp. 173. t. 82. Virea scabra. Scop. insub. 2. p. 25. t. 13. Hab. in arenosis maritimis Barbariae. ♂

7. *ruderale*, caule erecto hispido, fol. lanceolatis ciliato-dentatis, pedunc. calycibusque hispidis. Willd. p. 1558. Hab. in Bohemia in rupibus. Radix praemorsa. Flos. parvus. ♂

1772. HELMINTHIA. Cal. duplex : interior 8-phyllo, aequalis ; exterior, 5-phyllo, laxus. Recept.

nudum. Pappus stipitatus, plumbosus. Sem. transversim striata.

1. *echioides*, caul. exterioris foliolis latis cordato-ovatis subspinoso. Gaertn. fr. 2. p. 368. t. 159. f. 2. Lam. ill. t. 648. Picris. L. Lob. ic. t. 557. f. 2. Hab. in Gallia, Italia et Anglia in sylvis, in agris et ad vias.

2. *spinosa*, cal. exterioris foliol. lanceolatis margine apiceque spinosis. Decand. Synops. p. 265. Hab. in Pyrenaeis. Sem. subpubescentia, albida.

1773. HIERACIUM. Cal. imbricatus, ovatus. Recept. nudum, aut passim subpilosum. Pappus simplex, sessilis, (ex albido succescens. Genus polymorphum.)

\* *Scapo unifloro*.

1. *aureum*, scapo unifloro subnudo, calycib. hispidis, fol. lanceolato-spathulatis runcinato-dentatis glabriusculis. Willd. Sp. III. p. 1559. Villars delph. 3. p. 65. t. 33. Leontodon aureum. L. Jacq. aust. t. 297. Hab. in alpibus. ♂

2. *hyoseridifolium*, scapo folioso brevi unifloro, fol. runcinatis : laciinis reflexis basi caliceque pilosis nigrescentibus. Villars (ined.) Hab. in monte Mesmer prope St. Gall. Rad. subfusciformis, truncata, fibrosa. Caul. 2-unc. longus, 4-6 fol. obsitus. V.

3. *rupestre*, scapo unifloro unifolio, cal. hirsuto, fol. lanceolatis runcinate-dentatis, subpubescentibus, dentibus recurvis. Willd. Allion. Auct. p. 12. t. 1. f. 2. Hab. in montibus Pedemontanis, Helvetici et Salisburgensibus. Habitu Apargiae. Ver. scapo bifloro.

4. *pinnatifidum*, scapo unifloro nudo, fol. runcinato-pinnatifidis utrinque villosis dentatis. Willd. p. 1560. Tournes. cor. 35. Habit. in Armenia. Flos magnitude Traxaci. ♂

5. *purpureum*, scapo unifloro nudo, fol. pinnatifidis subtilis villosis, laciinis linearibus lanceolatis acutis dentatis. Willd. Hab. in Tauriae rupibus cretaceis. Flor. purpurei.

6. *alpestre*, scapo unifloro unifolio, superne tomentoso, cal. cylindrico tomentoso, fol. lanceolatis denticulatis. Willd. Jacq. aust. t. 191. H. tubulosum. Schlecht. excl. synon. Hab. in pratis subalpinis. Scapus triplicaris. Cal. fusco-tomentosus. ♂

7. *alpinum*, scapo unifloro subnudo villoso, calyce villosissimo, fol. lanceolatis