

L'aigrette est blanche, simple & sessile. Cette plante croît dans la Sibérie, & est cultivée au Jardin du Roi. *Æ.* (v. v.)

37. EPÉRVIERE à feuilles de Chicorée, *Hieracium intybaceum*. *Hieracium foliis inferioribus oblongis runcinato-dentatis erosis; caulinis parvis raris sagittato-linearibus subintegerrimis*. N.

*Hieracium intybaceum, flore luteo*. Bauh. Pin. 128. Prodr. 64. Tournef. 470.

β. *Idem caule humiliori subnudo paucifloro*. *Hieracium intybaceum, flore magno albido*. Bauh. Pin. 128. Prodr. 64. Tournef. 471. *Hieracium*. Hall. Helv. n°. 41. *Hieracium albidum*. Vill. Prospect. 36.

Le caractère distinctif de cette espèce doit se tirer de la considération des feuilles, dont la forme est assez remarquable; car la plante varie dans sa grandeur & dans le nombre des fleurs qu'elle produit. Sa tige est haute d'un pied ou quelquefois un peu plus, légèrement striée, un peu velue, feuillée médiocrement, & presque nue dans sa partie supérieure, où elle est munie de quelques rameaux alternes, ordinairement simples & uniflores. Les feuilles inférieures ou radicales sont oblongues, rétrécies vers leur base sans être pétiolées, roncées & découpées sur les bords en dents ligulaires, inégales, la plupart perpendiculaires à la feuille ou à la côte moyenne. Ces feuilles sont longues de quatre à six pouces, larges presque d'un pouce & demi, vertes, chargées de poils courts un peu abondans. Les feuilles caulinares sont lancéolées-linéaires, la plupart entières, & embrassent la tige par deux petites oreillettes pointues qui les font paroître sagittées. Les fleurs sont grandes, d'un jaune pâle, & ont leur calice velu. J'ai trouvé cette plante sur le Mont-d'Or. (v. v.) J'ai reçu plusieurs individus secs de la variété β, qui ne s'élève souvent qu'à la hauteur de six ou sept pouces; sa tige est quelquefois uniflore, d'autres fois elle se divise en deux ou rarement trois rameaux aussi uniflores. L'aigrette est très-blanche, simple & sessile. Cette Epervière croît dans les Alpes du Dauphiné, de la Suisse, &c. *Æ.* (v. f.)

38. EPÉRVIERE à feuilles de Lampane, *Hieracium Lampanoides*. G. *Hieracium caule folioso hirsuto multifloro, foliis radicalibus lyrato-runcinatis, extimo cordato, caulinis cordato-amplexicaulibus, pedunculisque hirsutis*. Gouan. Illustr. 57. t. 21. f. 3.

*Hieracium Pyrenaicum Lampanæ Dodonæi foliis*. Tournef. 472.

Sa tige est haute de trois pieds, anguleuse, légèrement velue, feuillée, ramifiée en corymbe à son sommet. Ses feuilles inférieures & radicales sont roncées, en lyre à leur base, & terminées par un lobe grand, cordiforme, denté & pointu. Les autres feuilles sont en cœur ou ovales, pointues, dentées, auriculées ou amplexicaules. Elles sont toutes chargées de poils courts peu abondans.

Botanique. Tome II.

Les fleurs sont jaunes, de grandeur moyenne, portées sur des pédoncules rameux, nuds, légèrement velus ou hispides. Les calices sont embriqués d'écaillés très-aiguës, un peu velues, & serrées. L'aigrette est blanche, simple & sessile. Cette plante croît dans les Pyrénées, & nous a été communiquée par M. l'Abbé Pourret. *Æ.* (v. f.)

39. EPÉRVIERE glutineuse, *Hieracium glutinosum*. Lin. *Hieracium foliis lanceolatis runcinatis scabriusculis, floribus umbellatis*. Lin.

*Hieracium dentis leonis folio, floribus parvis*. Bauh. Pin. 127. Prodr. 63. Tournef. 470.

Elle a le port du *Crepis tectorum*; ses feuilles sont molles, glutineuses; les supérieures sont lancéolées, très-entières; la tige est striée. Cette plante croît dans le Languedoc. ☉. Lin. Elle paroît très-peu connue.

40. EPÉRVIERE savoyarde, *Hieracium sabaudum*. Lin. *Hieracium caule erecto multifloro, foliis ovato-lanceolatis dentatis semi-amplexicaulibus*. Lin. Mill. Dict. n°. 5. Pollich. Pal. n°. 747. Allion. Fl. Ped. n°. 796. t. 27. f. 2.

*Hieracium fruticosum latifolium hirsutum*. Bauh. Pin. 129. Tournef. 472. Moris. Hist. 3. p. 70. Sec. 7. t. 5. f. 59. *Hieracii sabaudi varietas duplex*. J. B. 2. p. 1030. *Hieracium*. Gmel. Fl. Sib. Vol. 2. n°. 30. t. 14. *Hieracium*. Hall. Helv. n°. 35.

β. *Hieracium sabaudum altissimum, foliis latis brevibus crebrius nascentibus*. Moris. Hist. 3. p. 71.

γ. *Idem foliis maculatis*.

δ. *Idem foliis caulinis raris distantibus*.

Sa tige est droite, cylindrique, dure, velue, abondamment garnie de feuilles, & s'élève à la hauteur de trois pieds ou quelquefois davantage. Ses feuilles sont éparées, nombreuses, amplexicaules, ovales-lancéolées, pointues, munies de quelques dents aiguës, plus ou moins velues, & un peu roides. Les supérieures sont courtes, élargies près de leur base; les inférieures sont plus alongées, élargies dans leur milieu, & en pointe aux deux bouts. Les fleurs sont jaunes, de grandeur médiocre, viennent en corymbe terminal sur des pédoncules velus ou un peu cotonneux, quelquefois presque entièrement glabres, avec quelques bractées écailleuses fort petites & pointues. Les folioles calicinales n'ont point leur pointe rejetée en dehors; l'aigrette des semences est d'un blanc un peu sale. Cette plante est commune dans les bois, en France, en Allemagne, &c. Cultivée ou très-adulte, elle devient presque glabre, & ses feuilles sont alors d'un verd noirâtre. *Æ.* (v. v.) La variété β est cultivée au Jardin du Roi; elle s'élève à la hauteur de quatre ou cinq pieds; ses feuilles sont très-nombreuses, larges de plus d'un pouce; les pédoncules sont courts, rameux, écailleux, bien en corymbe. La variété γ a les feuilles tachées de roube-brun; enfin, on trouve dans les bois une variété dont les feuilles caulinares sont en petit nombre & dis-