

1580. *Hieracium chondrillaefolium* Fries. — Mont-Séuse près Gap (E. Burle).

1591 bis. **HIERACIUM LEIOPOGON** Gren. in litt. 28 janvier 1872. — M. Grenier nous envoie la description suivante de cette espèce, qui était encore inédite :

Tige de 1-2 décim., rar. plus, ord. simple, terminée par 1-5 fleurs, plus ou moins tomentuse-étolée et parfois munie vers le haut de poils glanduleux rares ou abondants. Feuilles un peu épaisses, ovales-lancéolées ou lancéolées, velues-hispides sur les deux faces, très-rarement glabrescentes en dessus, plus ou moins dentées, à pétioles plus ou moins laineux, ord. plus courts que le limbe; pédoncules simples ou bifides, cendrés-tomenteux par des poils étolés mêlés de poils simples et de poils glanduleux rares ou abondants; calathides à folioles aiguës, cendrées et à poils étolés plus ou moins mêlés de poils simples et de poils glanduleux; ligules d'un jaune doré, à dents glabres; styles jaunes; akènes noirs; réceptacle glabre, à alvéoles munies à l'un des angles d'une dent triangulaire souvent denticulée. Espèce voisine des *H. farinulentum* Jord., et *H. rupestre* All., hab. Alpes des environs de Gap; au-dessus du Devez de Rabou, Mont-Séuse, col de Glaise, etc. (MM. Burle frères).

1631. *Campanula stenocodon* Boiss. et Reut. — Mont-Viso sous les chalets de Ruines et descente du col de la Croix-sur-Abriès (Reuter).

1801. *Cynoglossum montanum* Lam. — Forêt d'Esparon près le Monestier-du-Percy, col de Roussel près Die (G. Fazende).

1926. *Phelipaea carulea* C. A. M. — Abriès, parasite sur l'*Achillea millefolium* L. (abb. Faure).

1927. *Phelipaea arenaria* Walp. — Huez en Oisans près de la chapelle de Saint Ferréol (abbé Faure, 1871); espèce parasite sur les racines de l'*Artemisia campestris* L.

1934. *Orobanche scabiosa* Koch. — Mont-Viso au vallon de Ruines (abb. Faure).

1940. *Orobanche toricata* Reich. — Huez près la chapelle Saint-Ferréol (abb. Faure).

1945. *Orobanche ritro* Gren. et Godr. — Vallée de Cervières près de Briançon (abb. Faure).

2150. *Aristolochia Pistorlochia* L. — Nefles près Gap (E. Burle).

2233. *Salix rubra* L. — Présente deux variétés :

1° Feuilles vertes et glabres en dessous, tomenteuses, soyeuses en dessous; *Salix eleagnifolia* Tausch.; 2° feuilles courtement pétiolées, oblongues, lancéolées, glauques en dessous; *S. rubra* var. *purpureoides* Gren. et Godr. Les deux variétés dans les îles du Rhône à Saint-Vallier (E. Chabert).

2236. *Populus canescens* Smith. — Environs de Gap (E. Burle).