

lentem sparsis, foliis tenuioribus eleganter sanguineo-venosis. Capitula parva basi tantum sub lente glandulifera. (v. s. s.)

$\beta$ . *commutatum* (Frœl. mss.), scapo subaphyllo, foliis elliptico-spathulatis. H. Gronovii Willd. herb. 14667. n. 2 nec 1. (v. s. s. in herb. Willd. commun. à cl. Richard.)

71. H. SUBNUDUM (Frœl. mss.), scapo erecto basi subunifolio hirsuto superne glabro, foliis obovatis denticulatis pilosis, paniculâ filiformi divaricatâ, pedunculis apice involucrique basi glanduloso-scabris.  $\frac{1}{2}$  in Americâ septentr. Stenotheca subnuda Monn. ess. p. 72. H. venoso proximum. Capitula H. paniculati magnitudine et formâ. Fructus teste cl. Monnier fusiformes. Plantam Monn. non vidi. Habitu affine Pilosellis.

$\beta$ . *retusum* (Frœl. mss.), scapo subaphyllo glabro, foliis obovato-subrotundis retusis apiculatis petiolatis pilosis. (v. s. s.) Non paucis à typo notis recedit, distinguere tamen nolui. Folia coriacea glanduloso-denticulata brevissimè petiolata suprà viridia pilosa subtùs glauca glabriuscala, parùm longiora quam lata. Involucrum calyculatum basi sub lente glanduliferum, squamis internis 12-14, externis 4-5 triplò brevioribus instructum. Panicula ferè capillaris.

\* \* TOLPIDIFORMIA (1). Invol. calyculatis, squamis omnibus linearibus, exterioribus brevissimis. — Habitus Tolpidis sed setæ pappi setulis minimis nullis interjectis separate. Radix cylindracea perennis. Folia radicalia. Caulis subnudus apice paniculatus.

72. H. CAPENSE (Linn. amœn. acad. 6. p. 96), caule subnudo glabro stricto apice paniculato, foliis radicalibus obovato-oblongis, obtusis remotè dentatis utrinque sebris, caulinis paucissimis sub ramorum exortu sitis linearibus integerimis, pedicellis elongatis, invol. farinosi squamis linearibus pauciseriatis.  $\frac{1}{2}$  ad cap. Bonæ-Spei. Crepis striata Thunb. fl. cap. 613. Picris striata Spreng. syst. 3. p 264. Schmidtia Capensis Reichenb. in litt. ad Frœl. Achænia cylindracea glaberrima. Pappus sordidè albescens subuniserialis. (v. s. commun. à cl. Ecklon.)

$\beta$ . foliis obovato-oblongis glabris. — ad Draakensteenbergh legit cl. Drege et mecum comm. (v. s.)

$\gamma$ . foliis elongatis oblongo-linearibus glabris. — in prom. Bonæ-Spei legunt cl. Ecklon et Drege. (v. s.)

73. H. MADAGASCARIENSE (DC. herb.), caule subnudo tereti glabro apice parcè ramoso-paniculato, foliis radicalibus oblongis obtusis glabris subintegerrimis, caulinis paucissimis linearibus, pedicellis elongatis parcè bracteolatis, invol. farinosi squamis linearibus, exterioribus brevissimis.  $\frac{1}{2}$ ? ad fossas in aridis montis Tananarivo ins. Madagascar legit cl. Bojer. Flores slavi. Achænia prismatica truncata. Pappus stramineus. Proximè accedit ad H. Capense sed folia glabra triplò minora. Herba 7-8-pollic. Caulis non sensim striatus, etc. (v. s. comm. à cl. Bojer.)

74. H. SILHETENSE (DC. herb.), glabrum, radice crassâ cylindraceâ, caulis è collo plurimis sulcato-angulatis subnudis apice paniculato-corymbosis, foliis radicalibus utrinque acuminatis integerrimis, caulinis paucis lineari-subulatis elongatis, invol. cylindraceo subcalyculato 10-12-floro, achaeniis longit. striatis.  $\frac{1}{2}$  in Indiae orientalis montibus Silhet legit cl. Wallich. Prenanthes? Candolleana Wall. cat. n. 32. comp. n. 390. (v. s. comm. ab hon. cur. merc. angl. Ind. orient.)

\* \* \* ORTUOTHECA. Capitulis majoribus ovatis squamis multarum serierum imbricatis. — Herbæ colore sèpissimè glauco, pedunculis superne sèpè squamosis.

75. H. STATICIFOLIUM (All. ped. n. 782. t. 81. f. 2), caule ramoso oligocephalo,

(1) Divisio exotica à cl. Frœlich omissa hic à DC. inserta.