

Felsen-Habichtskraut. W.

*Habitat in montibus Pedemontanis, Helveticis et Salis-*  
*burgensibus. 4 (v. f.)*

*Planta habitu Apargiae caractere generico Hieracii. Folia radicalia bi-vel tripollicaria pilis mutissimis obsita leviter dentata vel runcinata, dentibus lanceolatis recurvis. Scapus ascendens uniflorus basin versus folio runcinato instructus, ascendens semipedalis. Squama linearis sub calyce. Flos satis magnus flavus. Calycis foliola lanceolata hirta. Receptaculum nudum. Pappus pilosus sessilis. W.*

*Variat at rarius scapo bifloro. W.*

\* 3. **HIERACIUM pinnatifidum.** W.

H. scapo unifloro nudo, foliis runcinato-pinnatifidis utrinque villosis dentatis. W.

Dens leonis orientalis tenuissime divisus tomentosus et incanus. *Tournef. cor. 35.*

Tiefeingeschnittenenes Habichtskraut. W.

*Habitat in Armenia. 4 (v. f.)*

*Folia radicalia bipollicaria petiolata runcinato-pinnatifida incana, laciniis oblongis acute angulato-dentatis; utrinque pilis copiosis albis adpressis mollibus parvis obsita. Scapus bi-vel tripollicaris teres incanus nudus uniflorus. Flos flavus magnitudine Taraxaci. Calycis squamae lanceolatae albo-pilosae intermixtis pilis atris. Receptaculum nudum. Pappus pilosus sessilis. W.*

\* 4. **HIERACIUM purpureum.** W.

H. scapo unifloro nudo, foliis pinnatifidis subtus villosis, laciniis lineari-lanceolatis acutis dentatis. W.

Purpurblumiges Habichtskraut. W.

*Habitat in Tauriae rupibus cretaceis. 4. de Boeber. (v. f.)*

*Folia radicalia vix semipollicaria lanceolata pinnatifida subtus albo-villosa; laciniis lineari-lanceolatis acutis dentatis. Scapi bipollicares filiformes nudi teretes cani. Flos purpureus parvus. Calycis squamae margine membranaceae lanceolatae. Receptaculum nudum. Pappus sessilis pilosus. W.*