

Cnicus niveus Pres. Calata di S. Martino.

Sonchus arvensis. Sotto Tarsia.

Tolpis grandiflora. « *Caule corymbifero, foliis radiis calibus lanceolatis dentatis, involucris setaceis calyce farinoso longioribus, floribus pollicaris diametri, se minibus 5 - aristatis*. Planta glabra glaucescens. Ten. Alle falde del Sirino.

Senecio rupestris. Piano di Ruggia.

S. Doronicum. Alla parte orientale del piano di Ruggia.

Doronicum Columnae. Ten. Ruggia.

Leontodon levigatus. Pollino.

Apargia cichoracea. Ten. Ruggia.

Cynara humilis. Ne' campi argillosi, tra Castrovillari e Spezzano Albanese.

Hypochaeris pinnatifida Ten. Piano di Ruggia.

Arnica lanigera Ten. Ruggia.

Carlina acaulis. Nasce tra i sassi alla valle di Pedarreto, poco prima della Bocca del piano del Pollino. È valoroso rimedio antifebbriile.

Cineraria cordifolia. Salita di Ruggia, dalla via del Tempone, e sul piano del Pollino.

Centaurea seussana. Piano del Pollino.

Achillea punctata. Piano di Ruggia.

A-ligustica. Cosenza. È gran rimedio contro le affezioni calcolose.

Hieracium pseudo-pilosella. Ten. Piano del Pollino.
H. pumilum « *Radice praemorsa, scapis unifloris decumbentibus, flaccidis hispidiusculis, ramentis foliacois rariter ramulo florifero instructis, calycibus calyculatis, pedunculisque sub flore farinoso glabriusculis, foliis lineari-lanceolatis glabris utrinque attenuatis dentatis, vel runcinato-pinnatifidis, dentibus vel laciniis remotis, lanceolato linearibus acutis parallelis.* » Ten. Nel piano di Ruggia.