

190. HIERACIUM (*sanc&uum*) foliis lyratis obtusis dentatis, scapo nudo multifloro.

*Habitat in Palæstina. Hasselquist. 24.*

*Radix tenuis, fibrosa. Folia radicalia, plura, obovata, lyra-ta, dentata, obtusa, petiolata, pubescentia. Scapus foliis duplo altior, subpubescens, apice gerens Flores 5, s. 7, parvos, luteos, Pedunculis villosis, valycibus im-bricatis, acutis.*

191. CARDUUS (*mollis*) foliis pinnatifidis linearibus sub-tus tomentosis, caule inermi unifloro.

*Carduus mollis, Laelniato folio. Baub. pin. 377.*

*Carduus mollior L. Clus. hist. 2. p. 151.*

*Habitat in alpibus Austriz.*

*Folia radicalia, plura, linearia, pinnatifida, subiner-mia, subtus albo tomentosa, supra subpubescentia. Caulis teres, simplex, subtomentosus, inferne pa-rum foliosus, superne subnudus, inermis. Calyx terminalis, majusculus, crassiusculus, squamis mu-cronato-subulatis non pungentibus. Corolla purpu-rea. Folia echinopis anni sunt.*

192. BIDENS (*atripicifolia*) caule paniculato, foliis del-toidibus alternis dentatis petiolatis stipulatis.

*Habitat in America meridionali. Miller.*

*Caulis laevis, herbaceus, paniculatus. Folia deltoidea (Chenopodii), tenuia, dentata, nuda, in petiolos de-sinentia, alterna. Stipulae pares, reniformes fastig-auricularum. Flores solitarii, terminales, oblongo-ovati, absque radio. Receptaculum subulatum, pa-leis longitudine flosculorum apice villosis. Flosculi minimi. Semina oblonga, tetragona, mutica.*

193. SANTOLINA (*squarrosa*) pedunculis unifloris late-ralibus, foliis ovalibus mucronatis recurvatis.

*Habitat in Æthiopia. Burmannus 5.*

*Fruticulus determinate ramosus, inæqualis. Folia alter-na,*