

lentem sparsis, foliis tenuioribus eleganter sanguineo-venosis. Capitula parva basi tantum sub lente glandulifera. (v. s. s.)

β. commutatum (Frøel. mss.), scapo subaphyllo, foliis elliptico-spathulatis. H. Gronovii Willd. herb. 14667. n. 2 nec *i.* (v. s. s. in herb. Willd. commun. à cl. Richard.)

71. H. SUBNUDUM (Frøel. mss.), scapo erecto basi subunifolio hirsuto supernè glabro, foliis obovatis denticulatis pilosis, paniculæ filiformi divaricata, pedunculis apice involucratae basi glanduloso-scabris. \mathcal{U} in Americâ septentr. Stethotheca subnuda Monn. ess. p. 72. H. venoso proximum. Capitula H. paniculati magnitudine et formâ. Fructus teste cl. Monnier fusiformes. Plantam Monn. non vidi. Habitu affine Pilosellis.

β. retusum (Frøel. mss.), scapo subaphyllo glabro, foliis obovato-subrotundis retusis apiculatis petiolatis pilosis. (v. s. s.) Non paucis à typo notis recedit, distinguere tamen nolni. Folia coriacea glanduloso-denticulata brevissimè petiolata supra viridia pilosa subtus glanca glabriuscula, parvum longiora quam lata. Involucrum calyculatum basi sub lente glanduliferum, squamis internis 12-14, externis 4-5 triplò brevioribus instructum. Panicula ferè capillaris.

* * TOLPIDIFORMIA (1). Invol. calyculatis, squamis omnibus linearibus, exterioribus brevissimis. — Habitus Tolpidis sed setæ pappi setulis minimis nullis interjectis separatae. Radix cylindracea perennis. Folia radicalia. Caulis subnudus apice paniculatus.

72. H. CAPENSE (Linn. amœn. acad. 6. p. 96), caule subnudo glabro stricto apice paniculato, foliis radicalibus obovato-oblongis, obtusis remotè dentatis utrinque scabris, caulinis paucissimis sub ramorum exortu sitis linearibus integerimis, pedicellis elongatis, invol. farinosi squamis linearibus pauciseriatis. \mathcal{U} ad cap. Bonæ-Spei. Crepis striata Thunb. fl. cap. 613. Picris striata Spreng. syst. 3. p 264. Schmidtia Capensis Reichenb. in litt. ad Frøel. Achænia cylindracea glaberrima. Pappus sordidè albescens subuniserialis. (v. s. commun. à cl. Ecklon.)

β. foliis obovato-oblongis glabris. — ad Draakensteenbergh legit cl. Drege et mecum comm. (v. s.)

γ. foliis elongatis oblongo-linearibus glabris. — in prom. Bonæ-Spei legerunt cl. Ecklon et Drege. (v. s.)

73. H. MADAGASCARIENSE (DC. herb.), caule subnudo tereti glabro apice parcè ramoso-paniculato, foliis radicalibus oblongis obtusis glabris subintegerrimis, caulinis paucissimis linearibus, pedicellis elongatis parcè bracteolatis, invol. farinosi squamis linearibus, exterioribus brevissimis. \mathcal{U} ? ad fossas in aridis montis Tananarivou ins. Madagascar legit cl. Bojer. Flores flavi. Achænia prismatica truncata. Pappus stramineus. Proximè accedit ad H. Capense sed folia glabra triplò minora. Herba 7-8-pollic. Caulis non sensim striatus, etc. (v. s. commun. à cl. Bojer.)

74. H. SILHETENSE (DC. herb.), glabrum, radice crassâ cylindracea, caulis è collo plurimis sulcato-angulatis subnudis apice paniculato-corymbosis, foliis radicalibus utrinque acuminatis integerrimis, caulinis paucis linearis-subulatis elongatis, invol. cylindraceo subcalyculato 10-12-floro, achaenias longit. striatis. \mathcal{U} in Indiæ orientalis montibus Silhet legit cl. Wallich. Prenanthes? Cандолеана Wall! cat. n. 32. comp. n. 390. (v. s. commun. ab hon. cur. merc. angl. Ind. orient.)

* * * ORTHOTHECA. Capitulis majoribus ovatis squamis multarum serierum imbricatis. — Herbæ colore sèpissimè glauco, pedunculis supernè sèpè squamosis.

75. H. STATICIFOLIUM (All. ped. n. 782. t. 81. f. 2), caule ramoso oligocephalo,

(1) Divisio exotica à cl. Frøelich omissa hic à DC. inserta.