

lanceolatis, omnibus margine submembranaceo : Corolla purpurea, calyce duplo longior; semi-flosculi tubus filiformis, apice paulo incrassatus, hirtus; ligula truncata, quinque-dentata : Antherae in longum tubum coilate : Stigma bifidum, exsertum : Semina subcylindrica brevia, multi-angulata, anguli toti tuberculis acutis asperati, in serrae modum dispositis : Pappus densus, setis apicem versus simplicibus, inferne plumosis : Semina nondum perfecte matura vidi.

H. in pratis Cyrenaica.

Expl. TAB. XVII. fig. 4. o flosculus cum semine et pappo; n semen.

SONCHUS TINGITANUS: Willd. Sp. Pl. III. p. III. 1516. Smith Fl. gr. Prod. II. p. I. 126. **PICRIDIUM tingitanum**: Desfont. Fl. atl. II. 220.

H. in montibus Cyrenaicis.

APARGIA TARAXACIFLORA: Setuloso-hispida; foliis sinuato-pinnatifidis; floribus paniculatis; calycis foliolis exterioribus laxis. TAB. XXII. fig. 1.

Tota planta setulis albicantibus, patentibus hispida : Radix simplex, annua : Caulis hinc inde ramulosus, teres, ramis superioribus in pedunculos elongatis, nudiusculis: Folia radicalia sinuato-pinnatifida, longè in petiolum attenuata, laciniis obtusis, inæqualibus; superiora laciniis profundioribus, angustioribusque: Flos 1 cent. longus : Calyx ex hemisphærico cylindricus, densis setulis hispidus, calyculatus foliolis duplo brevioribus, lineari-acutis, laxis; foliola interiora dupli serie disposita, lineari-lanceolata : Corolla lutea, paulo calycem superans; ligulae truncatæ, quadridentatae, tubus hirsutus: Semina linearia, brevia: Pappus sessilis, piloso-plumosus, laxus: Receptaculum excavato-punctatum, pilis sparsum.

H. prope Cyrenem.

Expl. TAB. XXII. fig. 1. b semiflosculus cum semine; c semen cum pappo; d pappi radius; a receptaculum.

APARGIA HASTILIS: Willd. Sp. Pl. III. p. III. 1543.

Var. β scapo squamuoso, foliis pilis simplicibus, margine præsertim, hirtis. Nob. TAB. XXVI. fig. 1.

H. in Cyrenaicâ.

Obs. Licit non absque oscitantiâ hanc plantam in varietatem A. hastilis recipiam, nolo tamen novam speciem condere in genere ubi consultius esset nonnullas expungere, quâm novas adiicere. Foliis, glabritie scapi calycisque cum A. hastili quidem, et magis quâm cum reliquis congruit; at folia pilis raris sparsa; scapus squamu-losus, non nudus, et quod majoris momenti differentiam præbet; calyx non basi tantum squamis nonnullis parvis munitus, sed reapse imbricatus.

Expl. Tab. XXVI. fig. 1. a flosculus cum semine et pappo.

HIERACIUM SIMPLEX: Scapo simplici, unifloro, prope calycem incrassato, squamifero; foliolis calycinis, unicâ serie, in cylindrum conniventibus; foliis obovato-ellipticis, sinuato-dentatis; seminibus apicem versus coarctatis. TAB. XIII. fig. 4.

Radix simplex annua : Folia omnia radicalia obovato-elliptica, sinnato-dentata, dentibus utrinque duobus tribusve, pilis brevibus ad lentem hispidula: Scapus uniflorus, vix 7 cent. longus, glaber, prope calycem incrassatus, squamisque tribus, quatuorve, lineari-acutis munitus, per ætatem defluentibus : Calyx cylindricus, foliolis 8 — 9 basi veluti coarctatis, lineari acutis, conniventibus; dorso nervosis, hirsutisque : Corolla lutea, calyce duplo longior: Ligulae truncatæ, quadridentatae, tubus laevis: semen lineare ovatum, apice coar-

ctato, hinc veluti urceolato: Pappus sessilis, 7 — 10 setulis, rigidulus, ad lentem scabris, ultrà calycem paulò exsertis compositus: Receptaculum nudum.

H. in pratis Cyrenaicæ.

Obs. Nullo semiflosculosarum generi adamassim congruit: Major verò cum Hieraciis, licet adversante calyce, quām cum reliquis consensu.

Expl. TAB. XIII. fig. 4. a semen cum pappo; b semiflosculus cum semine.

CREPIS NUDIFLORA: Setuloso-hirta; foliis spathulato-oblongis, dentatis; pedunculis nudis, calyculi foliolis linear-setaceis, patentibus; corollâ calicem paulò superante; seminibus stipitatis, transversè rugosis. TAB. XIII. fig. 2.

Radix simplex: Reliqua planta setulis patentibus sparsa: Caules 1. decim. circa alti, ex eâdem radice plures subæquales, erectiunculi, alii aphylli, apicem versùs nunc bifidi in pedunculos unifloros, nunc parcè dichotomi; alii parcè foliosi: Folia radicalia spathulato-oblonga, ferè sessilia, dentata, dentibus porrectis, ciliata; caulinæ, ubi adsunt, semiamplexicaulia, cæterum reliquis conformia; floralia ad pedunculorum dichothomiam linear-acuminata et linear-setacea: Flos paulò ultra centim. longus: Cayculi foliola linear-setacea, patentia, inæqualia, tertiam circa calycis longitudinem æquantia: Calyx basi paulò ampliatus, cylindricus, 7 — 8 foliolis linearibus acutis, compositus, in tubum conniventibus, nervo dorsali setulis nigricantibus patentibus hirto, itemque pilis brevibus adpressis, lente conspicuis, sparsò: Corolla lutea, calyce paulò major: Ligulæ apice profunde quadridentatæ: Semen linear-ellipticum, transversim tuberculato-rugosum, in longum stipitem attenuatum: Pappus densis pilis simplicibus compositus: Receptaculum nudum.

H. in Cyrenaicæ pascuis.

Expl. TAB. XIII. fig. 2. a semiflosculus; b semen magnitudine naturali; c idem auctum.

CREPIS NIGRICANS: Setuloso-hispida; foliis caulinis lanceolato-amplexicaulibus, sinuato-dentatis; summis integerrimis; calyculi foliolis linear-acutis, patentibus; calycinis dorso pilis nigris hirtis. TAB. X. fig. 3.

Planta setulis albis, patentibus sparsa: Caulis paniculatus, foliosus, teres, ramosus, ramis divaricatis: Folia radicalia desunt: caulinæ ad ramorum ortum linear-lanceolata, amplexicaulia, sinuato dentata, dentibus porrectis, basim versùs dentato-incisa; summa, ad pedunculorum originem, linear-acuta, sessilia, integerrima: Pedunculi ex extremis ramis nudi: Calix 1. centim. longus, foliolis 8. compositus, linearibus acutis, in cylindrum conniventibus, dorso setulis longis, nigris patentibus, dupli serie dispositis, hispidus: Cayculi foliola, calyce duplò breviora, patentia, laxa, linear-lanceolata, pilis nigris, rigidis, hispida: Corolla calyce duplò ferè longior, lutea; ligulæ truncatæ, 4 — 5 dentatæ: Semina linearia, brevia: Pappus sessilis, densissimis pilis simplicibus compositus; Receptaculum ad lentem foveolis margine membranaceis sculptum.

H. in montibus Cyrenaicæ.

Expl. TAB. X. fig. 3. a" semiflosculus cum semine; b" semen cum pappo.

CREPIS FILIFORMIS: Foliis linear-lanceolatis, ellipticisque, integris, vel remotè sinuato-dentatis; pedunculis aliis radicalibus, filiformibus, unifloris, nudis, aliis multifloris foliosis; bracteis linearibus in laxum calyculum confluentibus. TAB. XXI. fig. 1.

