

Pilofella major fecunda. *Tabern. Kraeut. p. 507.*

Occurrit in collibus herbidis apricis. Floret aestate. 2

Planta tota pilis elongatis valde hirsuta. *Pedunculi* 3-6 breues subumbellati. *Flores* parui.

1608. *HIERACIUM cymosum.*

H. scapo folioso hispido, floribus corymbose-paniculatis, pedunculis propriis glomeratis, calycibus hispidis. *Linn. ed. Willd. 3. p. 1566. Flor. dan. t. 810. Hall. hist. n. 51. Pall. ind. taur.*

Pilofella altera major. Tabern. Kraeut. p. 507.

Crescit locis editis graminosis, cum praecedente. 2

Differt a praecedente defectu stolonum, foliis in caule pluribus, floribus numerosis ad 40 usque, pedicellis brevissimis.

** *Caule folioso.*

1609. *HIERACIUM sonchifolium.*

H. caule basi folioso ramofo subquadrifloro, pedunculis elongatis, foliis runcinatis incanis, calycibus tomentosis.

Habitat in abruptis subalpinis Caucasi orientalis. Floret Julio, Augusto. 2

Facies H. glauci Allion. pedem. t. 28. f. 3 et t. 81. f. 1. Folia radicalia et nonnulla baseos caulis runcinata dentata incano-pubescentia: ea quae pedunculis subsunt parva subintegra. *Caulis* pedalis glabriusculus basi incano-pubescentis, in ramos 2-3 unifloros vel bifloros elongatos praeter squamulam unam alteramue minimam nudos subdivisus. *Flos* magnitudine *H. Pilofellae*. *Calyx* albo-tomentosus, intermixtis pilis nigris brevissimis. *Corollulae* luteae. *Semina* fusca. *Pappus* pilosus sessilis.

1610. *HIERACIUM murorum.*

H. caule erecto folioso piloso simplici, floribus paniculatis; foliis ovatis basi profunde dentatis. *Linn. ed. Willd. 3. p. 1577.*