

*lanceolata* L.

D. PLANIPETALAE.

1. *Sem. nudo.*

a. *Placenta nuda.*

*Lapsana zacintha* L. \*

b. *Placenta paleacea.*

*Scolymus hispanicus* L. \*

2. *Sem. pap. aut aristis coronato.*

a. *Placenta nuda.*

*Leontodon hirtum* L. \*

*Hieracium aurantiacum* L. \*

*dubium* L. \*

*kalmi* L.

*sabaudum* L. \*

*paludosum* L. \*

*villosum* L. \*

*cerinthoides.* \* (69)

*glaucum* \* (70)

*staticifolium* \* (71)

*taraxaci* L. \*

*intybaceum.* \* (72)

*Crepis tibirica* L.

*alpina* L. \*

*tubra* L.

*biennis* L. \*

*pulchra* L. \*

*dioscoridis* L. \*

*austriaca* L. \* (73)

*Hyoseris hedypnois* L.

(69) Vere differt a *HIERACIO villoso* L. cui caeteroquin simile est. Foliorum superior superficies glabra, & in ambitu tantum pilosa. Calyx fere calyculatus, ex squamis linearibus acutis in apice compositus, nigris brevibus densisque pilis hirtus, non habens villum sericeum, uti *Hieracium villosum* L.

(70) *Hieracium foliis lanceolatis glaucis, caule brachiato multifloro* HALL. em. 11 v. 96. A sequenti omnino est distinguendum, folia longissime elliptica acuto fine, glauca, obiter denticulata, ambitu, & costa pilosa. Calyx ovatus, ex squamis multorum ordinum dense appressis, viridibus, in ambitu tonento albicantibus: semina aliquantum incurva, oblonga, striata, coronata pappo simplici sessili.

(71) A *porrifolio* L., & *glauco* separandum. *Perrifolii* iconem, & descriptionem dedit Cl. IACQUIN. *Staticifolium* folia habet remote, et obiter denticulata, concava, fere linearia, nunquam pilosa. Rami, & pedunculi satis squamosi. Calyx calyculatus ad basim, squamis parvis fere capillaribus. Calyx verus e uno ordine squamarum viridium dorso obscurius virente.

(72) *Hieracium foliis oblongis, asperis, lanceolatis, dentatis, calyce hirsutissimo* Hall. hist. n. 41.

(73) Est *Hieracium Pyrenaicum* L. β. γ. δ.