

913. APARGIA.

13. (1-11). *A. ALPINA*: scapo unifloro squamoso, superne incrassato subhirsuto, calycibus hispidis, foliis lanceolato-oblongis glabriusculis. *W. Sp.*
Hab. in alpin. Europ. temperat. 4. *D. intr.* 1815.

11. (12-2). *A. CAUCASICA*: scapo nudo unifloro glabro, calyce hirsuto, foliis runcinato-dentatis scabris subpilis, pilis simplicibus prostratis. *Bieb. Cauc.*
Hab. in Caucaso. 4. *F. intr.* 1814.

915. PICRIS.

3. (1-2). *P. RHACADIOLUS*: foliis integris amplexicaulis oblongis, calycibus interioribus tornoso-articulatis hispidis: foliolis cymbiformibus. *Pers. Syn.*
Hab. prope Malagam Hispaniæ. 4. *D. intr.* 1815.

917. HIERACIUM.

65. (6-68). *H. STOLONIFERUM*: foliis ovatis subtus lepidotis, stolonibus repentibus.
Hab. — — 4. *D. intr.* 1815 ex horto *Vindobonensi* sub hoc nomine.

68. (65-7). *H. COLLINUM* *W. Suppl.*: pilosum, scapis nudis ramosis: ramis elongatis subunifloris, foliis lanceolatis, stolonibus repentibus.
Hab. in Hungaria? 4. *D. intr.* 1815.

69. (7-8). *H. BIFURCUM*: scapo bifurco subbifloro basi subsolioso, foliis lanceolatis acutis integerrimis, stolonibus nullis. *Bieb. Cauc.*
Hab. in Tauria. 4. *D. intr.* 1816.

71. (8-9). *H. ANGUSTIFOLIUM*: scapo subtrifloro unifolio hirsuto, foliis lineari-lanceolatis acutis pilosis. *W. Sp.*
Hab. in Montib. Salisb. et Italiæ. 4. *D. intr.* 1816.

64. (16-17). *H. HALLERI*: caule erecto subbifloro, foliis pilosis dentatis, radicalibus oblongis, caulinis lanceolatis sessilibus, calyce villosa. *W. Sp.*
Hab. in alpi. Delphin., Helvetiæ et Silesiæ. 4. *D. intr.* 1814.

63. (20-21). *H. STERNBERGII* Hoppe: caule folioso erecto ramoso, foliis radicalibus petiolatis lanceolato-oblongis integerrimis, caulinis oblongis amplexicaulibus basi dentatis, calycibus hispidis.
Hab. in Germaniæ austr.? 4. D. *intr.* 1814.
67. (31-32). *H. SYLVATICUM*: caule erecto simplici, foliis oblongis villosis subdentatis, floribus subpedunculatis. *W. Sp.*
Hab. in Europæ sylvaticis. 4. D. *intr.* 1814.
72. (40-41). *H. HUMIFUSUM*: caulibus virgatis procumbentibus glabris, foliis lanceolatis acuminatis dentatis glaucis glabris, calycibus subpilosis. *Spreng. Pug. 2.*
Hab. — — 4. D. *intr.* 1816.
66. (48-49). *H. PROSTRATUM* Desf. *Tabl.*: caule prostrato apice florifero, foliis lanceolatis remote dentatis lanatis.
Hab. — — 4. D. *intr.* 1813.
70. (51-52). *H. INCANUM*: caule erecto tomentoso, corymbo composito, foliis ovato-lanceolatis amplexicaulibus integris subundulatis incanis ciliatis. *Bieb. Cauc.*
Hab. in Caucaso. 4. D. *intr.* 1815.

918. CREPIS.

26. (3-4). *C. TARAXACIFOLIA*: foliis runcinato-pinnatifidis dentatis hispidis, scapis ascendentibus basi foliosis multifloris, calycibus tomentosis, squamis exterioribus patulis. *W. Sp.*
Hab. in arvis Barbariæ. ♂. D. *intr.* 1814.
24. (23-6). *C. CROATICA*: foliis glabris, radicalibus oblongo-ovatis remote dentatis, superioribus linearilanceolatis sagittatis integerrimis, caule calycibusque hispidis.
Hab. in Croatia. ☉. D. *intr.* 1817 ex horto Pestiano sub hoc nomine.
25. (7-8). *C. GRANDIFLORA*: foliis radicalibus oblongis denticulatis, caulinis inferioribus sessilibus oblon-