

In agris et sterilibus Balearium frequens. Floret Martio, Aprili.  
Hab. in totâ regione mediterraneâ, Ægypto exceptâ.

291. PICRIDIMUM TINGITANUM. Desf. ! Atl. II, p. 220. — *Scorzonera tingitana*. Linn. Spec. 1114. — *Sunchus tingitanus*. Lam. Dict. III, p. 379.

In arenosis maritimis insulæ Majoris prope Artam, Soller et Ebusi prope S. Eulaliam. Floret Aprili, Majo.

Hab. in Andalusiâ!, Barbariâ!, Ægypto (Del.), Natoliâ et insulâ Cypro (Smith).

292. HYERACIUM TRIASII. Nob.

*Radix* perennis, crassiuscula, fusca, obliqua. *Caulis* 6-12 uncias longus, adscendens, simpliciusculus, obtusè angulatus, flexuosus, virescens, villis crispis densiusculis basi vestitus, supra medium glabriusculus, ad ramorum et pedunculorum exortum niveo-lanatus. *Folia* dentata, dentibus acutis, retroflexis, remotiusculis, eiliata, utrinquè præsertim dorso pilis longiusculis dispersa; radicalia spathulata, apice obtusissima, dimidium caulem æquantia, 3-6 uncias longa, 1  $\frac{1}{2}$ -2 uncias lata, in petiolum attenuata; caulina sessilia, inferiore majore, ovato-oblongo vel spathulato, superioribus minimis, lineari-lanceolatis, subulatis. *Flores* paniculati, paniculâ simplici, pauciflorâ (5-8 flora). *Pedicelli* tomentosi. *Involucrum* campanulatum. *Squamæ* erectæ, duplici ordine imbricatæ, omnes dorso tomentosæ; 6-8 exteriores lineari-lanceolatæ, angustissimæ, setis 6-8 subulatis, longissimis, remotis ciliatæ; interiores plures, paulò longiores et latiores, margine nudæ, dorso secundum lineam mediâ pilis uniseriatis hispidæ, subulatis, longiusculis, remotiusculis. *Receptaculum* villosiusculum. *Ligulæ* aureæ, 6 lineas longæ, involucrum superantes, limbo sublineari, apice 5-dentato. *Pappus* simplex, sub lente denticulatus, ligulis dimidiò brevior.

In fissuris rupium montis qui villæ *D.*, *Trias* imminet, prope Esporlas, in insulâ Majori. Floret Majo.

Hanc speciem dixi in honorem clarissimi *Trias*, insulæ Majoris incolæ, botanices curiosi, qui plantas Balearicas benè multas communicavit, et in plantis circa Esporlas perquirendis mihi benevolum ducem se præbuit.

Obs. J'aurois désiré établir cette espèce d'une manière plus sévère, en la distinguant de celles qui ont avec elle quelque rapport; mais ces recherches deviennent extrêmement difficiles dans un genre aussi peu connu. Tout ce que je puis en dire, c'est que je n'ai rien trouvé, dans les auteurs, qui pût s'y rapporter; et qu'après avoir parcouru les herbiers du Muséum, de MM. de Jussieu, Desfontaines, Delessert, Richard, et la riche collection de M. Gay, qui est, sans contredit, la plus nombreuse en *Hieracium*, je n'ai rien trouvé qui pût lui être comparé.

293. *CREPIS VESIGARIA*. Linn. Spec. 1132.

Ad margines agrorum in insulâ Majore prope castellum Belver. Florebat Martio.

Hab. in agro Neapolitano!, Calabriâ!, agro Bysantino (D'Urv.), Cretâ!.

294. *BARKHAUSIA TARAXACIFOLIA*. Thuill. Flor. Paris, ed. 2, 1, p. 409.

In agris prope Valldemosam in insulâ Majore. Florebat Aprili.

295. *HYOSERIS RADIATA*. Linn. Spec. 1137.

In collibus aridis prope Palmam, Artam in insulâ Majore. Floret Martio, Aprili.

Hab. in totâ regione mediterraneâ, Ægypto exceptâ.

296. *HYOSERIS SCABRA*. Linn. Spec. 1138.

Ubique in aridis insulæ Majoris. Floret Martio.

Hab. in Occitaniâ!, agro Nicænsi (DC.), regno Neapolitano!, insulâ Melitâ (D'Urv.), Cretâ!, Barbariâ (Desf!).

297. *HYOSERIS HEDYPTNOIS* α. *Caule diffuso, calycibus fructigeris glabris*. Sebast. et Maur. Flor. Rom. Prodr. 273. — *H. hedyptnois*. Linn. Spec. 1138. — *Hedyptnois monspeliensis*. Willd. Spec. 1616.

In aridis insulæ Majoris prope Artam, Lluch. Florebat Aprili.