

inæqualibus mucronatis sæpè dentatis. \mathcal{L} in Archipelagi Græci insulis Naxo ad montem Zia (Tourn. Oliv.!), Melo (d'Urv.), Syra (Auch.!), in Taygeto (Zucc.!). Scorzonera Græca, etc. Tourn. voy. 1. p. 223. Catananche Græca Linn. sp. 1142. Scorzonera elongata Willd. sp. 3. p. 1507. Hymenonema Tournefortii Cass. dict. 22. p. 316. Variat foliorum lobis linearibus et ovatis. (v. s.)

2. H. ASPERUM, foliis scabris radicalibus caulinisque inferioribus elongatis remotè pinnatifidis, lobis acuminatis integris. — in Oriente semina legit cl. Olivier. Scorzonera aspera Desf. ann. mus. h. n. par. 1. p. 133. t. 9. Pers. ench. 2. p. 362. Scorzonera stylosa Pers. ench. 2. p. 361. Hymenonema Fontanesii Cass. dict. 22. p. 317.

DCCCXIII. SCORZONERA DC. *fl. fr. ed.* 3. p. 59. *Less. syn.* 134. — Scorzonera Gelasia et Lasiospora Cass. — Scorzonera et Lasiospermum Fisch. — Scorzonerae sp. Linn. Gærtn.

Capitulum multiflorum. Invol. imbricatum. Recept. nudum. Achænum estipitatum erostre (aut rariùs rostratum), areolâ laterali. Pappus pluriserialis conformis plumosus aut rariùs scaber. — Herbæ. Radix fusiformis aut tuberosa. Folia sæpiùs integerrima, rariùs dentata aut pinnatifida. Caulis simplex 1-cephalus aut ramosus, ramis 1-cephalis. Flores nunc purpurei, sæpiùs flavi, ligulis subtùs concoloribus aut purpurascensibus.

Sect. 1. EUSCORZONERA. — Scorzonera Cass. *dict.* 25. p. 63 et 264. — Scorzonerae sect. 1^a Less. *l. c.*

Achænia glabra. Pappus plumosus, paleis interiorum quinque apice nudis longioribusque. Capitula multiflora.

* *Floribus purpureis, foliis integris aut subdentatis rarissimè lobatis.*

1. S. ALBICAULIS (Bunge enum. pl. chin. n. 230), radice tuberosâ oblongâ, caule folioso 2-6-cephalo pedunculisque albo-tomentosis, foliis linearibus elongatis basi floccosis demùm glabratis nervosis, omnibus planis, invol. squamis lanceolatis acutis, exter. basi pubescentibus, achæniis glabris. \mathcal{L} ad radices montium Chiuæ septentrionalium. Flores pallidè rosei. Invol. cylindraceum. (v. s. comm. ab hon. acad. sc. petrop.)
2. S. SZOWITZII, glabra, radice tuberosâ globosâ, tubere supernè in truncum cylindraceum longè producto, foliis lato-linearibus glaucescentibus caule longioribus, caule 1-cephalo, invol. cylindrici squamis margine subscariosis, infer. brevioribus. \mathcal{L} in collibus siccis ad Schabanli distr. Khoi prov. Aderbeischan Persiæ legit cl. Szowitz. S. mollis Fisch. et Mey.! pl. Szow. ined. Cor. purpureæ. (v. s. comm. à cl. Fisch. et Mey.)
3. S. UNDULATA (Vahl symb. 2. p. 86), radice cylindricâ crassâ, caule erecto simplici subscapiformi aut ramoso, ramis apice subtomentosis 1-cephalis, foliis lanceolatis apice subulatis undulatis tomentosus aut glabratis, invol. cylindrici squamis acuminatis, exter. dorso tomentosus laxiusculis, inter. glabris. \mathcal{L} in Barbariæ arenosis (Desf.), Græciæ saxosis (Tourn.), inter lapides ad montem Sinai (Schimp.! n. 129) et in Ciliciâ (Auch.!). Desf. fl. atl. 2. p. 219. Lam. ill. t. 647. f. 2. mala. Capit. magnit. S. Hispanicæ. Cor. violaceæ. (v. s.)
4. S. ARANEOSA (Sibth. fl. græc. t. 785. ex prod. 2. p. 183), radice tuberosâ globosâ, caule 1-cephalo foliis brevioribus pulverulento tomentosis, foliis linearibus recurvis villosis seu glabriusculis, invol. squamis dorso pulverulento-hirsutis, exter. acuminatis apice recurvis. \mathcal{L} in insulâ Cypro (Sibth.). Affinis S. tuberosæ sed capitula triplò majora, etc. Flores purpurei. (v. s. sine loci desigu. à cl. Olivier in Oriente lect.)