

nium non involutum, caducum. — *Herbae pleraeque Europaeae, tenerae, annuae, glabriusculae, capitulis parvis.*

*L. communis* L. etc.

2. RHAGODIOLUS Tourn. Achaenium involutum a receptaculo non sponte secedens, inerme, rectum — *Herbae annuae, tenerae, regiones Mediterraneas habitantes, capitulis parvis, achaeniis divergentibus.*

*R. stellatus* Gaertn. = *Lapsana stellata* L. et *edulis* Gaertn. = *Lapsana Rhagodiolus* Scop.

3. KOELPINIA Pall. Achaenium latere exteriori spinosum, apice incurvatum. — *Herba Asiatica foliis linearilanceolatis, integerrimis.*

*K. linearis* Pall. = *Lapsana Kölpinia* L.

† 4. SOLDEVILLA (Lag.\*) Achaenium oblongum . . . . — *Herba Hispanica humilis, pilis ramosis hispido-setosa, annua, foliis integris; capitulis aureis; pedunculis clavatis; involucris gamophyllis, basi ventricosis.*

*S. hispida* Lag. = *Hispidella hispanica* Barnad. enc. bot. III. 134. = *H. Barnadesii* Cass. Dict. sc. nat. XXI. 248.

### SUBTRIB. III. HYOSERIDEAE.

Rhachis ebracteolata. Pappus aut coroniformis aut multi-paleaceus, paleis integris, latiusculis, saepissime brevibus.

1. ARNOSERIS Gaertn. Achaenium obpyramidatum, pappo coroniformi coriaceo integerrimo coronatum. — *Herba annua Europaea tantum basi ima foliata.*

*A. pusilla* Gaertn. sem. fr. II. p. 355. tab. 157. fig. 3. = *Hyoseris minima* L. = *Lapsana pusilla* W.

2. HYOSERIS L., Gaertn. Achaenium rostratum, incurvatum, conforme. Pappus difformis; achaeniis exterioribus coroniformis, dentatus; interioribus biserialis, multipaleaceus, paleis longissime acuminatis. — *Herbae erectae, annuae, regiones Mediterraneas incolentes, ramosae, hirsutae; capitulis solitariis, ramos superne incrassatos et aphyllis terminantibus; foliis integris; involucris uniserialibus.*

*H. cretica* Gaertn. sem. fr. II. p. 372. t. 160. f. 2.; *H. arenaria* Schouw. etc.

\*) Don in N. phil. Edinb. Journ. I. c. p. 78.