

GRONOVII. H. caule simplici foliisque pilosissimis : foliis oblongo-oboivalibus, integris : panicula parviflora calycibusque glanduloso-hispidulis.

Var. *α. nudicaule* : caule subunifoliato : panicula subfastigiata.

— *β. foliosum* : caule parce folioso : panicula oblonga.

HAB. *β.* in Virginia et Carolina.

— *α.* in Canada et Pensylvania.

H Y O S E R I S. L.

Recept. nudum. *Cal.* subæqualis. *Pappus* pilosus calyculatusque.

MONTANA. H. glaberrima, procumbens : foliis lanceolatis, integerrimis : scapo unifloro : pappo duplici ; paleolis minutis exterioribus pilisque paucis.

HAB. in altissimis montibus Carolinae septentrionalis.

ANGUSTIFOLIA. H. foliis lineari-lanceolatis, sensim acutissimis, glabellis ; dentibus rarioribus, exertis : scapo unifloro.

Affinis *H. majori*. WALT.

HAB. in Carolina.

AMPLEXICAULIS. H. erecta, glabra, glaucescens : foliis radicalibus oblongo-ovalibus, subintegris : scapo summitate bracteis am-

88 SYNGENESIA. POLYG. ÆQUALIS.

plexicaulibus vestito et inde subtrifloro ;
pedicellis elongatis.

Obs. Umbellula sæpius triflora , interdum 5-flora.

H. biflora? WALT.

HAB. in Pensylvania , Tennassée et Carolina.

VIRGINICA. *H.* pusilla ; foliis lyratis , glaucis :

L. scapo 1-floro : calyce 10-phyllo : pappo
duplici , membranaceo , vix piloso.

Obs. Habitus parvuli *Taraxaci*.

HAB. a Canada ad Floridam.

LEONTODON. *L.*

Recept. nudum. *Cal.* imbricatus , squamis laxius-
culis. *Pappus* plumosus.

TARAXACUM. *L.* calyce squamis inferne reflexis :

L. foliis runcinatis , denticulatis , lævibus.

HAB. ad ripas rivulorum ascendente mari inundatas ,
juxta *Charlstown*.