

haut tronqué et non débordant ; aigrette à soies plurisériées décroissantes, les paléacées à peine plus robustes que les autres et subulées. Scapes grêles, hispidules. Feuilles hérissées sur les nervures et plus ou moins ciliées aux bords, pennatipartites roncinées, à lobes lancéolés, longuement atténués, le plus souvent fortement dentés. — Fl. mai, juin.

Rochers maritimes, à Ténès.

Var. *vestita*. Péricline couvert de poils mous, longs et violacés, mêlés de papilles farineuses, à folioles extérieures égalant moitié des intérieures. Akènes ailés brièvement atténués au sommet non débordant ; aigrette composée de 5 à 7 soies inégales, paléacées à la base et d'une couronne extérieure de soies scabres très courtes. Scapes glabres ou un peu farineux, à peine épaissis. Feuilles un peu farineuses, restant vertes, pennatipartites roncinées, à lobes lancéolés contractés à la base et lobulés-dentés. — Fl. juin.

Rochers de grès : Gouraya de Cherchell.

### **Hyoseris blechnoides.**

Péricline glabre et vert, à folioles extérieures inégales, furfuracées aux bords, dépassant un peu le  $\frac{1}{3}$  des extérieures. Akènes ailés ovales oblongs, arrondis aux extrémités, longs de 5<sup>mm</sup> (et non de 9 à 10) ; aigrette à 5 paléoles subulées avec un rang extérieur de soies moitié moins longues et assez nombreuses ; les intérieurs linéaires-fusiformes à aigrette semblable ; les extérieurs comprimés, à aigrette coroniforme ; scapes grêles ascendants. Feuilles glabres, luisantes, un peu charnues, pennatipartites, à lobes récurves, arrondis, entiers ou anguleux, très obtus, subégaux, recouvrant un peu le rachis. Souche vivace. — Fl. juin.

Rochers maritimes : cap de Garde.

### **Tolpis microcephala** (*Eutopis*).

Calathides très petites (4<sup>mm</sup>), à pédoncules pourvus de