

- verticis.* 8. HYOSERIS fructibus ovatis scabris, caule ramoso.  
*Lapsana* fructibus ovatis scabris, feminis disci calyco-lato-pappolis. *Hort. spf.* 246. \*  
*Habitat in Creta.*

## HYPOCHÆRIS.

- semitr.* 1. HYPOCHÆRIS folijs dentatis, caule ramoso folioso, calycibus hispidis. †  
*Hypocharis hieracii barbati* folio, calyce hispido. *Vail. atl.* 1721. p. 215.  
*Hieracium alpinum*, dentis leonis folio acuto piloso protusso, capitulis pungenti lanugine obtitis. *Cup. cat.* 95. *Kaj. suppl.* 146.  
*Habitat in Sicilia.*  
*Calycis squamæ asperæ spinulis pungentibus.*

- Achyrophorus.* 2. HYPOCHÆRIS calycibus æqualibus hispidis. *Hort. cliff.* 385. \* *Hort. spf.* 240. \*  
*Achyrophorus* fere glaber, bellidis glauco-dentatoque folio. *Vail. atl.* 1721. p. 278.  
*Hieracium ramosum*, floribus amplis, calycibus valde hirsutis, foliis oblongis obtutis: dentibus majoribus inæqualibus incisis. *Kaj. suppl.* 144.  
*Habitat in Creta.* 2

- ponticus.* 3. HYPOCHÆRIS foliis lanceolatis dentatis, caule simplici folioso unifloro.  
*Hypocharis non ramosa*, endiviae folio prælongo, mucronibus. *Vail. atl.* 1721. p. 215.  
*Hieracium latifolium pontanum* præaltum glabrum, endiviae folio. *Bocc. mag.* 2. p. 148. t. 113. *Kaj. suppl.* 142.  
*Habitat in Sabaudia montibus.*

- maculata.* 4. HYPOCHÆRIS caule subnudo: ramo folitario, foliis ovato-oblongis integris dentatis. *Hort. cliff.* 385. *Fl. suec.* 631. *Roy. Ingab.* 125. *Dalib. paris.* 239.  
*Hypocharis hirsuta*, endiviae folio, magno flore. *Vail. atl.* 1721. p. 385. *Fl. lapp.* 288.  
*Hieracium alpinum latifolium hirsutie incanum*, flore magno. *Baub. pin.* 128.  
*Hieracium latifolium* t. *Clas. Hist.* 2. p. 139.  
*Hieracium alpinum*, foliis dentatis, flore magno. *Baub. pin.* 128. *prodri.* 65. *Hall. belv.* 760. t. 24.  
*Habitat in Europa frigidioris pratis asperis.* 2