

*Pedunculus & rachis foliis foliis farinaceis. Lobi foliorum imbricatis reflexi utrinque dentati, laeves. Semina membranaceas. Pappus simplici, sessili.*

3. HYOSERIS scapo simplicissimo unifloro: foliis scafodatis, scutellis, seminibus pappotis. *Hort. cliff. 386 Roy. Ingab. 127.*

*Taraxaconastrum, erysimi folio, flore minimo. Vaill. act. 1721. p. 235.*

*Dens leonis minimus, foliis hirsutis, calycis segmentis a flore decapito erectis & semina complexis. Raj. suppl. 147.*

*Habitat in Sicilia.*

4. HYOSERIS scapis unifloris, foliis lanceolatis lyrate virginice, glabris. *Gouy. virg. 60. \**

*Habitat in Virginia.*

*Folia radicalia prima ovata, rama lanceolata, demum lyrate, acuta, glabra. Scapi nudi, uniflori, foliis triplo longiores. Calyces simplicissimi, nec imbricati, ex decem foliolis lanceolatis. Corolla saturate lutea. Sequina tetragona, coronata marginie membranacea integro & insuper setis 3. f. 4. longis.*

5. HYOSERIS caule diviso nudo. *Hort. cliff. 386. Fl. maxima, sicc. 630. Roy. Ingab. 127. Sant. monsp. 14.*

*Hyoseris angustifolia. Tabern. ic. 180.*

*Hieracium minimum. Clus. hist. 2. p. 142.*

*Habitat in Europa artis apricis.*

\* *Caulis folioso.*

6. HYOSERIS fructibus subglobosis glabris, caule ramoso. *Hedypnois.*

*Lapsana fructibus subglobosis glabris, seminibus disci calyculato-pappotis. *Hort. upj. 246. \* Sant. monsp. 83.**

*Lapsana calyculibus fructus capitatis dichiscentibus, pedunculis incrassatis, floribus nutansibus. *Hort. cliff. 387. Roy. Ingab. 131.**

*Rhagadioloides calthæ folio, calyce glabro. *Vaill. act. 1721. p. 202.**

*Hedypnois annua. *Tournef. inst. 478.**

*Habitat in Europa australi. ○*

7. HYOSERIS fructibus globosis pilosis, caule ramoso. *Rhagadioloides.*

*Lapsana fructibus globosis pilosis, seminibus disci calyculato-pappotis. *Hort. upj. 246. \***

*Habitat in Europa australi. ○*