

*tis viscosis, sed runcinatis, dentatis, subpilosis &c.
Synonyma inter utramque dispartienda. H. U.*

- Rhagadio-16. CREPIS foliis integris amplexicaulibus, calycibus interioribus hispidis toruloso-sectis.

Habitat . . . ○.

Caulis semipedalis, erectus, striatus, scaber, ramosus. Folia oblonga, integra, amplexicaulia, lavia. Pedunculi elongati, scabri, uniflori, nudi. Calyx calyculatus: Exterior foliolis plurimis, linearibus, obtusis, calyce $\frac{1}{2}$ brevioribus, insertione inaequalibus. Interior torulosus sectusque in 13 partes parallelas, quarum quodvis foliolum cymbiforme, compressum, dorso hispido aculeolis glochidibus. Corolla lutea, extus purpurascens. Semina omnia Pappo piloso. H. U.

- Iucida. 9. HYOSERIS scapis unifloris nudis, foliis runcinatis subcarnosis angulatis dentatis.

Dens leonis græcus, foliis erysimi crassis & succulentis. Tournef. cor. 35.

Habitat in Oriente. Forstkåhl. 24.

Simillima H. radiata, sed Folia crassiora, subcarnosa, lucida, brevius dentata. Scapi parpurascentes, foliis longiores. Calyx angulatus. Semina marginalia vix papposa. Floret ante meridiem. H. U.



- carduelis. 3. ARCTIUM foliis pinnatifidis aculeatis.

Habitat in Alpibus Carneolæ superioris. D. Scopoli. Statura Serratulae arvensis. Caulis crispus, aculeatus. Folia amplexicaulia, pinnatifida, laciniata, margine aculeata. Calyces terminales, pedunculati: squamis linearis-setaceis, patentibus, incurvis.

- canus. 27. CARDUUS foliis decurrentibus lanceolatis, dentatis ciliato-aculeatis, utrinque arachnoideo-villosis.

Cirsium montanum maximum. Raj. hist. 305.

Cirsium tomentosum radice bulbosa. Baub. hist. 3. p. 44.

Carduus tuberosus. Jacq. vind. 280. secund. descript.

Habitat in Austria. 24.

Radices fusiformes, aggregatae, carnosæ, albæ, Sisari. Caulis quadripedalis, viridis, angulatus, arachnoideus. Folia lanceolata, subfinnata-dentata, spinulis albis vix prægeminibus ciliata, utrinque tomento arachnoideo