

- lucida. 3. H. foliis subcarnosis runcinatis angulatis dentatis. *Mant.*
p. 108. *Jacq. b. Vind. 2. t. 150.*
- virginica. 4. H. foliis lanceolatis lyratis glabris.
- scabra. 5. H. foliis scabris, feminibus papposis. *Bocc. mus. 2. t. 106.*
- caliculata. 6. H. foliis runcinatis, scapis subhirsutis, calice caliculato.
Poir. voy. en Barb. 2. p. 229.
- caroliniana. 7. H. foliis lyratis apice truncatis hirsutis. *Walt. flor. carol.*
p. 194.
- major. 8. H. foliis integris ensiformibus laevibus. *Walt. flor. carol.*
p. 194.
- minor. 9. H. foliis ovatis dentatis, scapo bifloro. *Walt. flor. carol.*
p. 194.
- pygmaea. 10. H. foliis spatulatis dentatis ciliatis, pappo stipitato plu-
moso. *Ait. hort. Kem. 3. p. 130.*

** caule diviso nudo.

- minima. 11. H. pedunculis incrassatis. *Flor. dan. t. 201.*

*** caule folioso ramoso.

- Hedypnois. 12. H. fructibus ovatis glabris. *Lob. ic. p. 239.*
- rhagadio- 13. H. fructibus ovatis pilosis. *Kniph. bot. orig. cent. 5. n. 44.*
loides.
- cretica. 14. H. fructibus ovatis scabris. *Scop. del. inf. 1. t. 16.*

917. SERIOLA. Recept. paleaceum. Cal. simplex.
Pappus capillaris stipitatus.

- laevigata. 1. S. laeviuscula, foliis obovatis dentatis.
- aethnensis. 2. S. hispida, foliis obovatis subdentatis. *Jacq. obs. bot. 4.*
p. 79. *Calix subcaliculatus. Pappus subplumosus.*
- urens. 3. S. urens, foliis dentatis, caule ramoso.
- cretensis. 4. S. hirta, foliis runcinatis.